


WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia



وَزَعَةُ التُّرَابِ الذَّهَبِيِّ النَّهَارِيَّةُ

Gold Dust Day Gecko

ترجمة: د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي



مركز ترجمة العلوم والمعارف

مؤسسة آفاق للبحث العلمي

وزغة التراب الذهبي النهارية

تأليف: مجموعة مدونين موقع الموسوعة الحرة «ويكيبيديا»

ترجمة: د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي

الرقم الكودي: ٥-٣/٣/٦/٢٠١٩

مؤسسة
قفأ
للبحث العلمي



مقدمة المُترجم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،
وبعد..

فإن الثقافة في بلادنا عن الأوزاغ قد انطبعت على الاستقباح والقشعريرة
والنفور والبغض، وإن لهذه المشاعر المشتهرة بين الناس أصول شرعية صحيحة
رغم أنف الجاهلين، كما أن لتلك المشاعر دوافع شكلية مورفولوجية تختص
بالأوزاغ ذاتها. فإن لدينا من الأنواع ما يزيد عن الثلاث وعشرين فصيلة منها، غير
أن أكثرها يتشابه في الألوان العامة والحجم أيضًا، وهذا من أقوى ما يطبع التصور في
أذهان الكثيرين منا عن عائلة الأوزاغ بجميع فصائلها.

ولعل أشهر فصائل الأوزاغ التي ساعدت في تغيير تصور الكثير من الناس عن
تلك الكائنات العجيبة الصغيرة في جميع أنحاء العالم، هي فصيلة وَزَغَة النمر
Leopard Gecko، والتي اشتهرت بتربيتها كحيوان أليف على نطاق واسع على
مستوى العالم. واليوم ميعادنا مع نوع من أنواع الأوزاغ، التي لن يصدّق الكثيرون
منا أنها تنتمي إلى تلك العائلة التي طالما احتقرها البعض واشمأز منها آخرون،
حتى يروا تلك الـ وَزَغَة الجميلة الأخاذة، وَزَغَة التراب الذهبي النهارية.

د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي


السلم التصنيفي لوزغة التراب الذهبي النهارية

TAXONOMY		التصنيف العلمي	
Kingdom	<i>Animalia</i>	الحيوانية	المملكة
Phylum	<i>Chordata</i>	الحبليات	الشعبة
Class	<i>Reptilia</i>	الزواحف	الطائفة
Order	<i>Squamata</i>	الحرشفيات	رتبة
Infraorder	<i>Gekkota</i>	الوزغيات	الرُتْبِيَّة
Family	<i>Gekkonidae</i>	الأوزاغ	العائلة
Subfamily	<i>Gekkoninae</i>	الوزغ	العائلة الفرعية
Genus	<i>Phelsuma</i>	الوزغات النهارية	الجنس
Species	<i>Phelsuma laticauda</i>	وَزْغَةُ التراب الذهبي النهارية	الفصيلة
Subspecies الفصائل الفرعية			
<i>Phelsuma laticauda laticauda</i>			
<i>Phelsuma laticauda angularis</i>			

وزغة التراب الذهبي النهارية

Gold Dust Day Gecko

وزغة التراب الذهبي *Phelsuma laticauda* هي أحد فصائل الأوزاغ النهارية.



تعيش هذه الـوزغة في شمال مدغشقر وفي جزيرة «كوموروس»، وقد تمَّ إدخالها إلى جزيرة «هاواي» وبعض جُزُر المحيط الهاديء الأخرى^[١]. إنها تعيش بالفعل على أنواع مختلفة من الأشجار، والمنازل. وتتغذى وزغة التراب الذهبي النهارية على الحشرات ورحيق الأزهار. وتلك الـوزغة أيضًا تُعرَف بِـ «جالبة الحظَّ».

هناك فصيلتان فرعيتان من هذه الـوزغة، هُما:

١. وَزغة التراب الذهبي *Phelsuma laticauda laticauda*.

٢. وَزغة التراب الذهبي *Phelsuma laticauda angularis*^[٢].

الوصف الشكلي «المورفولوجي»:



تتنمي وَزغة التراب الذهبي إلى جنس الـوزغات النهارية ذات الحجم الصغير، حيث يصل طولها الكلي إلى حوالي ١٥-٢٢ سم.

وزغة التراب الذهبي النهارية Gold Dust Day Gecko

ويتميز الجسم بلون أخضر فاتح أو أخضر مائل للصفرة، وحتى اللون الأزرق في أحيانٍ نادرة.



وتتميز هذه الوزغات النهارية بوجود بقع صفراء اللون على شكل نقاط صغيرة، تقع على منطقة الرقبة والجزء الأمامي من منطقة الظهر. كما توجد ثلاثة خطوط عَرَضِيَّة ذات لون صديءٍ على خَطْمِ الرأس^(١)، كما أنَّ الجزء العلوي من الجلد الذي يحيط بالعين له لون أزرق.

تقع على الجزء الخلفي من منطقة الظهر ثلاثة خطوط طولِيَّة مُسْتَدَقَّة^(٢) حمراء. وذيل وزَّعة التراب الذهبي مُفْلَطَح قليلاً، كما أنَّ الجزء السفلي من الجسم لونه أبيض فاتح *Off-white*. تفتقر الأفراد اليافعة - الشابة - إلى اللون الأحمر، كما أنَّ أطرافها وذيلها تظهر باللون الأبيض الفاتح.



(١) الخطم هو المنطقة المدببة التي تقع في المنطقة الأمامية من الرأس أما العينين، وتقع في طرفه فتحتا الأنف.

(٢) مُسْتَدَقَّة أي عريضة من طرف ومدببة من الطرف الآخر.

الغذاء:



هذه الوزغات النهارية تتغذى على أنواع متعددة من الحشرات واللافقاريات، كما أنها تستطيع أيضًا أن تأكل بعض أنواع السحالي الأصغر حجمًا. وهي تأكل أيضًا الفواكه الحلوّة الطريّة - ذوات الأنسجة الناعمة اللينة -

وحبوب اللقاح ورحيق الأزهار. وقد تتجمّع العديد من الوزغات في مجموعات لكي تقوم بالتغذي على نبتة واحدة في نفس الوقت.

الذكور:

إنّ ذكور هذه الفصيلة عدائيّة ومشاكسة إلى حدّ كبير؛ فإنها لا تقبل وجود ذكور أخرى ضمن مناطق نفوذها، كما أنّ الإناث لا يمكنها الهرب أيضًا حيث تستطيع الذكور أن تسبب لها جروح خطيرة.

التكاثر:



تضع الإناث عددًا من البيض يصل إلى خمسة أزواج. بعد ٤٠-٤٥ يوم تقريبًا، وفي درجة حرارة ٢٨° مئوية يفقس البيض عن الصغار. يصل طول الأفراد اليافعة إلى ٥٥ -

وزغة التراب الذهبي النهارية Gold Dust Day Gecko

٦٠ ملليمتر، ويجب أن ينشأوا منفصلين عن بعضهم البعض؛ وذلك لأن الصغار قد يكونون مشاكسين بشدة أيضًا. وتصل تلك الأوزاغ إلى مرحلة النضج الجنسي بعد ١٠-١٢ شهرًا.

التربية في الأسر والعناية بها:



يجب تربية هذه الأوزاغ بشكل منفصل أو في أزواج، وتحتاج إلى مسكن بيئي أرضي *Terrarium* مُتَّسع ومزروع جيّدًا. ويجب أن تكون درجة الحرارة حوالي ٢٨° مئوية أثناء فترة

النهار، وتنخفض إلى ٢٠° أثناء فترة الليل. ويجب الحفاظ على درجة الرطوبة ما بين ٦٥٪ إلى ٧٥٪.

في الأسر يمكن إطعام هذه الأوزاغ صراصير الليل *Crickets*، وديدان الشمع



Waxworms - وهي يرقات حشرة العثة الشمعية - وذباب الفاكهة، والديدان، والديدان القبابي *Mealworms*، والذباب المنزلي. كما أنه يمكن إطعامها أيضًا بعض

أنواع الفواكه مثل المانجو، كما أنها قد تقبل أن تأكل بعض أنواع الفواكه المختلطة التي تتوفر في المتاجر.

وزغة التراب الذهبي النهارية Gold Dust Day Gecko

المراجع:

١. Gerlach, J.; Ineich, I. & Vences, M. (٢٠١١). "Phelsuma laticauda". The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. ٢٠١١: e.T٦١٤٣٣A١٢٤٨٣٨٩٥. doi:١٠.٢٣٠٥/IUCN.UK.-٢٠١١.٢.RLTS.T٦١٤٣٣A١٢٤٨٣٨٩٥.en. Retrieved ٢٦December ٢٠١٧.
٢. Phelsuma laticauda at the Reptarium.cz Reptile Database. Accessed ٦June ٢٠١٣.
٣. Christenson, Leann and Greg (٢٠٠٣). Day Geckos In Captivity. Ada, Oklahoma: Living Art Publishing. p. ١٩٤.
٤. Henkel, F.-W.; Schmidt, W. (١٩٩٥). Amphibien und Reptilien Madagaskars, der Maskarenen, Seychellen und Komoren. Stuttgart: Ulmer. ISBN ٩-٧٣٢٣-٨٠٠١-٣.
٥. McKeown, Sean (١٩٩٣). The general care and maintenance of day geckos. Lakeside, CA: Advanced Vivarium Systems.



وزغة التراب الذهبي النهارية Gold Dust Day Gecko



مؤسسه
قفأ
للبحث العلمي

