

WIKIPEDIA  
The Free Encyclopedia



# عِظَاءَةُ التَّمْسَاحِ حَمْرَاءُ الْعَيْنِ

Red-eyed Crocodile Skink



ترجمة: د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي



مركز ترجمة العلوم والمعارف

مؤسسة آفاق للبحث العلمي

عظاءة التمساح حمراء العين

تأليف: مجموعة مدونين موقع الموسوعة الحرة «ويكيبيديا»

ترجمة: د. محمد بن عبد اللطيف آل برعي

الرقم الكودي: ١٢-٣/٣/١١/٢٠٢١

مؤسسة  
قفاء  
للبحث العلمي



## مقدمة المترجم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله من النبيين والمرسلين، وبعد،

عالمُ العظاءاتِ هو عالمٌ شديد التنوعِ، يَضمُّ الكثير من العائلات والتي يندرجُ تحتها الكثير من الأجناس والفصائل، التي تختلف كثيرًا في أشكالها وأحجامها وسلوكها. وتعدُّ عائلة السقنقوريَّات من أكثر تلك العائلات في عدد فصائلها، وكذلك من أكثرها انتشارًا في جميع أنحاء الكُرة الأرضية، وقد دخلت العديد من فصائل تلك العائلة في مجال الإتجار في الحيوانات الأليفة، وكثُر مُقتنوها في كثير من دُول العالم.

وعظاءة التمساح حمراء العين واحدة من فصائل السقنقوريَّات التي زاد انتشارها مؤخرًا في مجال التربية في الأسر، لها شكلٌ خارجيٌّ عجيب، يقترب من التماسيح، وليست منها، ولها عينٌ كبيرةٌ مُحاطةٌ بحلقة حمراء اللون، أضفت عليها مظهرًا أخاذًا يأسر العيون.. المعلومات الواردة في هذا المقال قليلة جدًا وغير مُستوفاة، وقد نقوم بترجمة مقالات أخرى عن تلك العظاءة في المستقبل، غير أننا لم نرغب في إضافة معلوماتٍ أخرى - وإن كانت متاحةً ومُتوفرة - لم ترد في المقال الأصلي.

د. محمد بن عبد اللطيف آل بُرعي

السلم التصنيفي لعظاءة التمساح حمراء العين

TAXONOMY		التصنيف العلمي	
<b>Kingdom</b>	<i>Animalia</i>	الحيوانية	المملكة
<b>Phylum</b>	<i>Chordata</i>	الحبليات	الشعبة
<b>Class</b>	<i>Reptilia</i>	الزواحف	الطائفة
<b>Order</b>	<i>Squamata</i>	الحرشفيات	رتبة
<b>Superfamily</b>	<i>Scincoidea</i>	السَّقَنْقُورِيَّات	العائلة الرَّئِيسِيَّة
<b>Family</b>	<i>Scincidae</i>	السَّقَنْقُورِيَّات	العائلة
<b>Subfamily</b>	<i>Egerniinae</i>	السَّقَنْقُورِيَّات الاجْتِمَاعِيَّة	العائلة الفرعية
<b>Genus</b>	<i>Tribolonotus</i>	السَّقَنْقُورِيَّات التمساحِيَّة	الجنس
<b>Species</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i>	سَقَنْقُور التمساح أحمر العين	الفصيلة

## عَظَاءَةُ التَّمْسَاحِ حَمراءِ العَيْنِ

### Red-eyed Crocodile Skink

تُعرَف تلك العظاءة *Tribolonotus gracilis* عادةً باسم عَظَاءَةُ التَّمْسَاحِ حَمراءِ



العَيْنِ، وهي أحد فصائل العظاءات التي تُربى أحياناً كحيوانات أليفة غريبة. وتتواجد تلك الفصيلة بشكلٍ حَصْرِيٍّ في غينيا الجديدة، حيث تعيش في الغابات الاستوائية المَطيرة. وقد تمَّ

وصفها وتصنيفها للمرَّة الأولى على يد عالم الزواحف الألماني «نيلي دي رويج Nelly De Rooij» في عام ١٩٠٩ م.

### المَوْطِن البِيئِي:



تعيش عَظَاءَةُ التَّمْسَاحِ حَمراءِ العَيْنِ في جزيرة غينيا الجديدة بإندونيسيا، وكذلك في بابوا غينيا الجديدة، وهي الجزء الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة. وتعيش تلك الفصيلة

من العظاءات السَّقَنقُورِيَّة في الغابات الاستوائية الرُّطبة التي تنتشر في تلك المناطق الجغرافية، كما أنَّها تكيَّفَت للعِيش في المناطق المأهولة بالسُّكَّان.

## عَظَاءَةُ التَّمَسَاحِ حَمْرَاءُ الْعَيْنِ Red-eyed Crocodile Skink



وعلى الرَّغْمِ من قُدرة تلك العظاءات على التَّسَلُّقِ، إِلَّا أَنَّهَا تَقْضِي أَكْثَرَ أَوْقَاتِهَا على أرض العَابَةِ، بَيْنَ أَوْراقِ الأشْجارِ المتساقِطَةِ، حيث تَظَلُّ مُلتَصِقَةً بفروع الأشْجارِ مُنْخَفِضَةً الارتفاعِ وبجذوع الأشْجارِ السَّاقِطَةِ. كما أَنَّهَا لا تُخَاطِرُ بالانتقالِ إلى الأجزاء العُلْوِيَّةِ الخضرَاءِ مِنَ الأشْجارِ.

### السُّلُوكُ:



تُعَدُّ عَظَاءَةُ أَوْ سَقَنْقُورِ التَّمَسَاحِ حَمْرَاءُ الْعَيْنِ مِنْ فِصَائِلِ العِظَاءَاتِ القليلةِ التي تُصْدِرُ أصْواتًا مُمَيَّزَةً عِنْدَمَا تَشْعُرُ بالتهديدِ أَوْ الاستثارةِ. وعِنْدَمَا تَتَعَرَّضُ العِظَاءَةُ للتهديدِ فَإِنَّهَا تَمِيلُ إلى البقاءِ جامِدةً مِنْ عَيْرِ حَرَكَ، كما لَوْ حِظَّ أَنَّهَا تَلْجَأُ إلى ادِّعَاءِ المَوْتِ، حتَّى في أَثناءِ التَّعاملِ معها مِنْ قِبَلِ مُرَبِّيِّهَا.

### التَّزْاُوجُ وَالتَّكَاثُرُ:

يُمْكِنُ تحديدُ جنسِ عَظَاءَةِ التَّمَسَاحِ حَمْرَاءُ الْعَيْنِ عَن طَرِيقِ بَواطِنِ أَقدامِهَا الإِسْفِنْجِيَّةِ البِيضَاءِ وَالمَسَامِ على أَقدامِهَا الخَلْفِيَّةِ، فَفَطَّ الذُّكُورُ تَمْتَلِكُ تلكَ المَسَامِ.

## عظاءة التمساح حمراء العين Red-eyed Crocodile Skink



تمتلك الإناث مبيضةً واحدًا قادرًا على التَّبويضِ، وهو المَبِيضُ الأيْمَنُ، والذي يقوم بوضع بيضةٍ واحدةٍ في كُلِّ مرَّةٍ.

بعد وضع الأنثى للبيضة غالبًا ما تقوم بالالتفافِ حَوْلَ البيضةِ لِحِمايتها والاعتناء

بها. كما أن الإناث تميلُ إلى التَّجمُّعِ في مجموعاتٍ والاعتناء بصغار بعضها البعض. وتقوم الذُّكور عادةً بِقتال بعضها البعض.

### التَّربِيَّةُ فِي الأَسْرِ:

عظاءة التمساح حمراء العين من العظاءات الشائعة في تجارة الحيوانات الأليفة،



غَيْر أنَّها لا تزال تُعدُّ من الحيوانات الغريبة. لِكَي تُربَّى تلك العظاءة في الأُسْر فإنَّها تحتاج إلى مَسْكَنٍ بيئيٍّ ذي طبيعةٍ أَرْضِيَّةٍ كبيرٍ *Terrarium* ،

على أن يكون قادرًا على تحمُّل وتوفير درجة عالية من

الرُّطوبة التي تحتاجها تلك الفصيلة.



تأكل أكثر عظاءات التمساح حمراء العين أنواعًا مختلفًا من الحشرات؛ مثل ذباب الفاكهة ويرقات الخنافس السوداء *Mealworms* والجداجد *Crickets*.

## عظاءة التمساح حمراء العين Red-eyed Crocodile Skink

وكأكثر فصائل الزواحف فإنَّ عظاءة التمساح حمراء العين تحتاج إلى مكملات غذائية من الكالسيوم، تُضاف إلى طعامها التقليديّ.



## المراجع والمصادر

١. The Reptile Database. [www.reptile-database.org](http://www.reptile-database.org).
٢. ^ <https://www.herpcenter.com/lizard-care-sheets/red-eyed-crocodile-skink-care-sheet/>
٣. ^ Russell, Matt. "Crocodile Sking Animal Biography" (PDF). *Animal Biography*. Retrieved ٢٦ January ٢٠١٧.



## الأعمال الصادرة عن مؤسسة آفاق للبحث العلمي

١. الجامع الأكبر في صفة ذي الطُفَيْتَيْن والأبتر.
٢. الجرذون السيناوي.
٣. الورل الصحراوي.
٤. ورل الأشجار الأسود.
٥. ورل الأشجار الفيروزي.
٦. ورعة التراب الذهبي النهارية.
٧. الورعة الفيروزية القزمية.
٨. الورعة ذات العُرف.
٩. جنس الأفاعي المُقرّنة.
١٠. السنجاب الهندي العملاق.
١١. الدليل المُصوّر للكوبرا الحقيقية.
١٢. الدليل المُصوّر لبوا الرمال.
١٣. الدليل المُصوّر للتماسيح.
١٤. دليل تربية الإحوانا الخضراء.
١٥. دليل تربية بوا الرمال الكئيبة.
١٦. هل هناك أعراض للإصابة بالسالمونيلا في الثعابين؟
١٧. تغذية الأحناس غير السامة.
١٨. أضخم الثعابين في العالم.
١٩. أفعى الفراشة قرنيّة الأنف.
٢٠. عظاءة التمساح حمراء العين.

مؤسسة  
قفاء  
للبحث العلمي

