


سبحان في عوالم كوفيد و، الخفية دراسة علمية



د. محمد فتحي عبد العال

الطبعة الأولى ٢٠٢٢

ديوان العرب للنشر والتوزيع

عنوان الكتاب: سمات في عوالم كوفيد 19 الخفية
اسم المؤلف: د. محمد فتحي عبد العال
التصنيف الأدبي: دراسة علمية
رقم الإيداع: 2022 / 14987
الترقيم الدولي: 9 - 977 - 998 - 475 - 978



التدقيق اللغوي: د. هبة ماردين
تصميم الغلاف: شيماء منير
التنسيق الداخلي: محمد وجيه
رقم الطبعة: الطبعة الأولى
المدير العام: د. فادية محمد هندومة
دار ديوان العرب للنشر والتوزيع - مصر - بور سعيد
تلفون: 00201030502390 - 00201211132879
بريد الدار: mohamedhamdy217217@gmail.com

سبحانَ فِي عَوَالِمَ كُوفِيد ١٩ الْخَفِيَّةِ

دِرَاسَةٌ عَلَمِيَّةٌ

د . محمد فتحي عبد العال

ديوان العرب للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى روح والدي الغالية السيدة ناريمان عبد الفتاح أحمد زردق (شهيدة كوفيد ١٩).

وإلى روح أخي العزيز الأستاذ أحمد فتحي عبد العال.

وقد شاء الله أن يكون موعد رحيلهما في نفس اليوم من شعبان لعامين متتاليين أهدي هذا الكتاب متمنياً أن يكون صدقة جارية على روحهما.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الكاتب

د. محمد فتحي عبد العال
(جبرتي الجائحة)

المقالات

السلالة الجديدة واللقاحات

أدى إعلان بريطانيا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد إلى حالة من الذعر حول العالم؛ فأغلقت دول عدّة حول العالم مجاهاً الجوي وقد جاء الإعلان في أعقاب حالة من الأمل بعثتها اللقاحات أخيراً. لكن هذا الإعلان عصف بحالة الأمل تلك وسط مخاوف من عودة الفيروس بصورة المتحورة للانتشار من جديد وبصورة أسرع وسط توقع ذلك بنسبة قد تصل إلى 70% مما يهدد بالخروج عن دائرة السيطرة مرة أخرى وسار التساؤل حول جدوا اللقاحات الحالية.

بحسب الدراسات الأولية، فالتحول قد حدث في بروتين سبائك وهو الذي يمنع الفيروس المستجد شكله التاجي الشهير، علاوة عن كونه المفتاح لدخول الفيروس لخلايا الجسم، فضلاً عن أنه الهدف الأساسي للقاحات الرئيسية الحالية وللعلاج بالأجسام المضادة، وقد حدثت الطفرة N501Y في الجزء الأكثر أهمية من بروتين سبائك والخاص بالتلامس والارتباط بخلايا الجسم، وهي منطقة ارتباط المستقبلات receptor binding ما يسهل من اختراق الفيروس لخلايا الجسم ويجعله أكثر حدة وقدرة على العدوى. إضافة لدراسات أخرى تشير إلى طفرة أخرى هي حذف

جزء صغير من بروتين سبائك H69/V70 وقد تم اكتشافها في السابق لدى حيوانات المink المصابة بكورونا، مما يجعل الأجسام المضادة في أجساد المتعافين أقل فاعلية في صد الصورة المتحورة الجديدة من الفيروس.

تعتمد فكرة لقاحات فايزر بيونتك ومودerna على استخدام نسخة اصطناعية من المادة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، وهي الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA ما يحفز الجهاز المناعي للجسم لإنتاج أجسام مضادة قادرة على التصدي للفيروس الحقيقي عند مهاجمته الجسم، فهو أشبه بالرسالة التي توجه للجهاز المناعي ليكون الجسم في حالة الجاهزية المستمرة وعلى الرغم من أمان اللقاح من الناحية النظرية إلا أن الوقت لا زال مبكراً للحكم من الناحية العملية لحداثة هذه التكنولوجيا.

وقد استثنى من اللقاح الأطفال والحوامل والمرضعات لعدم كفاية الدراسات حول سلامة الاستخدام في هذه الحالات.

وقد حصل لقاح فايزر بيونتك على تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويطلبأخذ حقنتين يفصل بينهما 21 يوماً.

وبحسب الشركتين المصنعتين فتبلغ نسبة الفاعلية للقاح فايزر بيونتك 95% بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية. ويعني هذا أن أكثر من 95% من الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح سيتمكنون بالحماية من الإصابة بمرض شديد ناتج عن فيروس كورونا المستجد، لكن اللقاح يحتاج إلى درجة

حفظ 70 درجة مئوية تحت الصفر، مما جعله ليس الخيار الأمثل لبعض الدول النامية.

في المقابل يمثل اللقاح الصيني سينوفارم خياراً مثالياً لبعض الدول النامية، حيث يحفظ في الثلاجات العادية وسط ضبابية شديدة فيما يتعلق بدرجة فاعليته وأمانه في ظل غياب الدراسات الكافية حوله ويقوم على الفكرة التقليدية في صناعة اللقاحات من الاعتماد على حقن جزيئات فيروسية ميتة غير نشطة.

ومع الإعلان البريطاني عن السلالة الجديدة سارعت ألمانيا إلى طمأنة العالم والإعلان أن اللقاحات الحالية تمتلك الفاعلية الكافية للتصدي للسلالة الجديدة، ويرجع هذا التفاؤل إلى أن اللقاحات فايزر بيونتك وموديرنا تدرب جهاز المناعة على مهاجمة بروتين سبايك للفيروس من عدة أجزاء للتغلب على مسألة الطفرات المحتملة به غير أنه في وجهة نظرى أمر يحتاج إلى التريث والمزيد من الوقت للبرهنة عليه بشكل فعلى وواقعي. فالفيروس جديد ونتعلم منه الجديد كل يوم كما تقول منظمة عموم الصحة الأمريكية .PAHO

وفيما يخص السؤال المحير منذ فترة حول استمرار إيجابية المسحة لدى البعض على الرغم من تعافيهم من كورونا المستجد وخلوهم من الأعراض فقد نجح فريق من الباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة

هارفارد في تقديم تفسير مثير، قد يقلب الموازين حول تشخيص كوفيد 19 حيث ذهبت الدراسة والتي نشرت في مجلة **Science** إلى أن جينوم **RNA** الخاص بكوفيد 19 يمكنه الاندماج مع الحمض النووي للكروموسومات البشرية **DNA** مختبرياً باستخدام جين إنزيم النسخ العكسي والذي يجعل **RNA** إلى **DNA** وبالتالي يبقى الفيروس مختبئاً في مكان غير متوقع داخل كروموسومات الخلايا البشرية، ولكن ليس بشكل دائم وتأتي هذه التجربة بنتائج على خلاف المشهور بين العلماء من أن الفيروسات تقوم بإدخال حمضها النووي **RNA** في الخلايا المصابة ولكن يبقى في معزل عن الحمض النووي للخلية **DNA**.

الحقيقة أن هذه الدراسة لو تأكّدت فلربما تقلب مسألة أمان وسلامة لقاحات فايزر بيونتك وموديرنا على المدى الطويل رأساً على عقب.

لقاحات كوفيد وأسئلة مفتوحة

مع انتشار هذه اللقاحات في أصقاع العالم على تنوعها راحت تثور بعض الأسئلة بين الفينة والفينية فكان التساؤل عن حاجة المتعافي من كوفيد - 19 للقاح، وقد اعتمدت الدول جرعة واحدة فقط له بعد 90 يوماً فأكثر من التعافي ذلك لأن الاستجابة المناعية ونسبة الأجسام المضادة التي ترتبط بالفيروس أو المحيدة في هذه الحالة مع جرعة واحدة تعلو تلك التي لدى الأشخاص الذين أخذوا جرعتين ولم يصابوا سابقاً بالفيروس بنحو 12 ضعفاً، وذلك بحسب دراسة هولندية. أيضاً السؤال عن خلط اللقاحات نظراً للنقص في الإمداد العالمي للقاحات، وذلك بأن تكون الجرعة الأولى من فايزر والثانية من استرازينكا على سبيل المثال، وقد ثبتت الدراسات الكفاءة المناعية الأعلى لهذا الخلط لكن يبقى التساؤل مفتوحاً عن الأعراض الجانبية المحتملة لهذا الخلط، وستعرض لشق الأعراض الجانبية في نهاية هذا المقال.

المفاجأة في مسألة المناعة ضد كوفيد كانت من نصيب المعمرين والذين عاصر بعضهم الأنفلونزا الإسبانية واجتازوها بسلام، كما اجتازوا أيضاً كوفيد ويرجع البعض ذلك إلى أن أجسادهم قادرة على تنظيم درجة الالتهاب وتقادم ردود الفعل المناعي المفرط الذي يسببه كوفيد 19.

لكن أصبح حديث الناس سؤالاً مهماً عن مدى أمان هذه اللقاحات وأعراضها الجانبية.

من الأعراض الجانبية ذاتعة الشيوخ: الشعور بالصداع والتعب والألم في موضع الحقن وألام بالعضلات وارتفاع درجة الحرارة وهي أعراض هينة تزول بعد فترة وجيزة.

أما الأعراض الجانبية النادرة فحتى الآن تم رصد حالات نادرة من جلطات الدم (التخثر) مع استخدام لقاحي جونسون آند جونسون الأمريكي واسترازينكا البريطاني ويجري تحري وجود هذه الخللات عبر الكشف عن الأجسام المضادة ضد **(PF4 platelet factor 4)** حيث تزعم بعض النظريات أن مادة **EDTA** التي تدخل في صناعة اللقاح وتساعد البروتينات على الانتشار في مجرى الدم يمكنها أن تتفاعل مع **PF4** فيختلط الأمر على الجهاز المناعي بأن إصابة بكتيرية بالجسم فيطلق الأجسام المناعية بشكل كبير فينتج عنها الجلطات. فيما يرى آخرون مسؤولية الفيروسات الغدية الحاملة للمادة الوراثية لفيروس كوفيد عن الجلطات وهو، الفيروسات التي تقوم عليها فكّة اللقاحين سالفه، الذك.

مصير واحد جمع أيضاً لقاحي فايزر وموديRNA هما الآخرين ولكن هذه المرة لدى فئات عمرية صغيرة حيث تم رصد حالات التهاب عضلة القلب

لديهم. وما زالت هذه الأعراض قيد الدراسة لمعرفة مدى مسؤولية اللقاحات المتهمة عنها بين مؤيد ومعارض.

ومع ندرة هذه الأعراض وغيرها في ضوء الإحصائيات الحالية إلا أن لدى رأي أهمس به همساً مع الحملات التي تملأ الإذاعات والتلفزيونات حول أمان اللقاحات جميعها بأن الوقت مبكر للحكم على ذلك، وأننا تعلمنا في علم الميكروبيولوجي تحت عنوانٍ رئيسٍ فيها أن الأعراض الجانبية للقاحات قد تظهر في التو وربما بعد وقت قصير منها هذا بالطبع في حالة اللقاحات التقليدية أما في حالة لقاحات mRNA القائمة على شيفرة جينية وهي تكنولوجيا جديدة تختبر للمرة الأولى على نطاق واسع فلا بد وأن نضع احتمالية ولو ضئيلة لتحول هذه الشيفرة لجزء من الجينوم البشري مع الوقت، ومصدر للطفرات مستقبلاً. ربما نعم وربما لا. لذا نحتاج سنوات للحكم على مدى أمان وسلامة هذه اللقاحات كما أن البيانات الحالية عن نسب الأعراض الجانبية تخرج من دول متقدمة لديها مراكز رصد ومراقبة وإبلاغ متقدمة وعلى مستوى مفترض من الشفافية فماذا عن الدول النامية والتي لا تمتلك الحد الأدنى للإمكانيات للإعلان عن أرقام إصابات كوفيد العالمية لديها بشكل صحيح؟ وبعضها لازال يعتبر كوفيد 19 مؤامرة هل نستطيع أن نخرج بنتائج حقيقة عن الأعراض الجانبية في ظل غياب الإحصائيات والشفافية في الإبلاغ وعدم وجود آلية

واضحة للإبلاغ في كثير من هذه البلدان، وفي ظل ارتفاع مستوى الجهل أيضاً بكثير منها؟

هذه ليست دعوة مني أبداً لعدمأخذ اللقاحات، بل صيحة لإعداد خطة صحية دولية لإدارة المخاطر طويلة المدى، تشمل الجميع لمواجهة الأعراض الجانبية التي تم رصدها؛ إذ إصابة شخص واحد كإصابة ألف لا يمكن التخلص منها، فالبشر سواء وكذلك الأعراض المتوقعة على المدى الطويل عبر بحث جاد ومحاید والتحلي بالشجاعة الكافية لمواجهة أعراض قد تظهر على المدى البعيد، وهي مسألة أخلاقية في الأساس وإن كانت تثير الهمج لدى الكثير من الشركات العالمية التي تخشى من توقف لقاحاتها دون تحقيق العائد المنتظر مع حجم الإنفاق الهائل في الأبحاث والتصنيع أو الدفع بها في قضايا تعويضات مستقبلاً. بالطبع شيء نبيل أن ننقذ البشرية في هذه اللحظة الراهنة من التاريخ الإنساني، وأن نضحي بكل غالٍ ونفيضٍ لكن ما العائد من هذه اللقاحات في جملتها في هذه اللحظة؟ العائد هو حماية مؤقتة تضمن أعراضًا أقل شدة عند الإصابة بالفيروس ولا تحول دون انتقال العدو، وهو عائد يتضاعل حينما يتعلق الأمر بأجيال حالية أو قادمة ربما تصب لعناتها يوماً على من تساهل في الحماية لأخذى اللقاح، إننا نتحرك اليوم في ملعب الجينات، وهو ملعب لا تحكمه قواعد لعبٍ ثابتة وكل السيناريوهات فيه محتملة، فلنكن على استعداد لكافة السيناريوهات بشفافية ووضوح.

مرضى السكري وخطر كوفيد المحقق

منذ أن اجتاح كوفيد 19 العالم ولا يتوقف عن توجيهه سهام تهديده لمرضى السكري ومنهم صاحب هذه السطور، فهم الأكثر عرضة للمضاعفات والأعلى معدلاً للوفاة، ولا يتوقف الأمر عند تهديد المصابين بالفعل بالسكري، بل يتخطاهم لتهديد المتعافين بـكوفيد وبهددهم بالإصابة بالسكري مستقبلاً، وتصل نسبة الإصابة بالسكري بنوعيه 1 و 2 بين المتعافين إلى 14.4٪.

العلاقة بين الفيروسات ومرض السكري ليست بوليدة كوفيد 19، ففيروسات أخرى شقت طريقها في الإضرار بمرضى السكري من النوع الأول مثل: كوكساكي ب واللحصة الألمانية.

لكن تظل مسببات هذا الإضرار محل اختلاف بين العلماء. في حالة كوفيد يأخذ التفسير اتجاهين أساسيين مع الأخذ في الاعتبار بعض السيناريوهات المحتملة.

الاتجاه الأول أن فيروس كوفيد يهاجم مباشرة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، محدثاً بها التلف مما ينقص من إفراز الأنسولين ومسبباً لها الموت المبرمج بشكل انتقائي أكثر من خلايا الفا ودلتا، وذلك

لتوارد مستقبلات ACE2 المدخل الرئيس للفيروس بها علاوة على neuropilin 1 والذى يسهل دخول الفيروس إضافة لبروتين TMPRSS2، ولكن بنسبة أقل والذي يلعب نفس الدور، وذلك بحسب دراسة لباحثين من جامعة ستانفورد وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت بعد وفاة مرضى كوفيد تدمير خلايا بيتا.

الاتجاه الثاني يرى أن كميات ACE2 لا تكفي في خلايا بيتا وأن الفيروس يسبب التلف بشكل غير مباشر عبر إلحاق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي خلايا بيتا، أو عبر مناطق أخرى من البنكرياس يحرى فيها التمثيل الغذائي للخلايا واستقلاب الجلوكوز ويعيد احتمالية ذلك كثرة ACE2 في الأوعية الدموية والكبد.

ثمة نظريات أخرى أن الالتهاب المرتبط بكوفيد 19 قد يؤثر على تنظيم مستوى السكر في الدم من خلال هرمونات التوتر والإجهاد، مثل: الأدرينالين والكورتيزول، مما يرفع مستويات السكر بالدم بشكل كبير. علاوة على ذلك فاشتمال علاج كوفيد على الستيرويدات، مثل: الديكساميثازون، من شأنه رفع نسبة السكر بالدم.

البعض أيضاً يرى أنه يمكن النظر لهذا الارتفاع في مستوى السكر لدى مرضى كوفيد من زاوية عدم معرفتهم بأن لديهم مرض السكري من

الأساس، أو أنهم على مشارف الإصابة وفي مرحلة ما قبل السكري منذ سنوات دون أن يدرؤا فهو مرض صامت اكتشافه يكون عادة بالمصادفة. الإشكالية القادمة في وجهة نظرى فيما يتعلق بمرضى السكري ستكون محطتها العين.

من المعروف أن مضاعفات عدة تصاحب مرض السكري متعلقة بالعين منها الرؤية الضبابية وإعتام عدسة العين، والجلوكوما واعتلال الشبكية وفي بداية الجائحة كانت تراود العلماء الشكوك بشأن انتقال كوفيد عن طريق العين من خلال الدموع التي يتواجد فيها الفيروس بنسبة ضئيلة والآن بات واضحًا أن الفيروس يمكنه إصابة أنسجة العين خاصة منطقة الحوف limbus لاحتواها على ACE2 وبروتين TMPRSS2 والذي يسهل دخول الفيروس للخلايا كما ذكرنا آنفًا، وذلك بحسب دراسة لباحثين من كلية طب مونت سيناي الأمريكية.

لذلك لابد من الحفطة فيما يتعلق بمرضى السكري أثناء الإصابة بكوفيد وبعدها، فالحفاظ على مستوى السكر في الدم في نطاق النسب المتعارف عليها أمر هام تحت إشراف الطبيب وشرب الماء وتجنب الجفاف والحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن وضرورة تجنب الإجهاد والحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة، وعليك أن تنسى عزيزي مريض السكري المثل القائل العين عليها حارس، ففي زمن الجوائح وقاية العين عبر ارتداء قناع الوجه

خاصة الممارسين الصحيين وغسل اليدين جيداً قبل لمس العينين هما أعظم حارس بمشيئة الله.. وفي فترة الإصابة بكوفيد ينصح بعدم عمل حمية غذائية والتخلّي عن الرياضة مؤقتاً مع مراقبة الوزن.

علاج فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مرضى كوفيد

تنوع أسباب فقدان حاستي الشم والتذوق ما بين التقدم في العمر بعد الستين وأورام الدماغ وأورام الأنف غير السرطانية وإصابات الرأس ونقص الفيتامينات مثل A وB6 وB12 والزنك وأمراض السكري والزهايمير وباركنسون والصرع، وسبب التدخين وإدمان الكحوليات، والروائح الكيميائية الخطيرة مثل: الكلور والفورمالديهيد، لكن تبقى العدوى الفيروسية على قمة هرم هذه الأسباب ومنها كوفيد 19.

لقد بات فقدان هاتين الحاستين من السمات المميزة لمرضى كوفيد 19 وبحسب الأبحاث الجارية بطب هارفارد؛ فالسبب في ذلك يعود لاستهداف الفيروس للخلايا الداعمة للخلايا العصبية الحسية في الأنف **sustentacular cells** والغنية بمستقبلات ACE2 التي يستهدفها الفيروس، فيما تذهب الأبحاث الإيطالية إلى أن السبب هو زيادة في جزيء الأنترلوكين 6 وهو من علامات الالتهاب. أياً كان السبب وما أكثر الأبحاث في هذا الصدد فالوضع مؤلم، ودائماً ما يصادفي السؤال أثناء عملي ما هو الحل لاستعادة الحاستين بعد التعافي من كوفيد 19؟ وأكثر ما يقلق المصابين عدم عودة الحاستين بشكل سريع بعد التعافي، فقد يستغرق ذلك

أياماً أو من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وقد تستمر لأشهر لدى البعض لكن الأمر الجدير بالاهتمام والذي ألمسه كثيراً في محادثاتي مع المتعافين من مرضي كوفيد 19 والمتزددين على الصيدلية هو حالات يحدث لديها تشوه في حاسة الشم أو خطل الشم **parosmia** فالروائح لم تعد مميزة، وأصبحت جبيعاً مشوهة وبشعة، فرائحة القهوة أصبحت مثل البنزين ورائحة الدجاج مثل الكبريت ومذاق الشيكولاتة كالمطاط المحلي، ولا ينبغي الخوف والقلق من ذلك فقد تكون علامة على التعافي لدى المصابين بفقدان حاسة الشم طويلاً. والحل يمكن في ضرورة التدريب على الرائحة، وهو أشبه بالعلاج الطبيعي للأذن حتى تستعيد حاسة الشم، وتتضمن تدريب الأنف على استنشاق بعض الروائح المميزة والقوية مثل: الليمون وقشره، والبرتقال، والقرنفل، وماء الورد، والنعناع، والكافور، والشوم، والبن المطحون، والفانيли، والعطور، والصابون لمدة 20 ثانية من 2-4 مرات يومياً، والأفضل أن يتم الانتقاء من بينهن لأربع نكهات مختلفة والتدريب عليها، ثم تغييرها كل 12 أسبوعاً.

الاهتمام بالغذاء الجيد المشتمل على اللحوم، والدواجن، والأسماك، والمكسرات، والخضروات، والفاكه، وإضافة زيت الزيتون، لكن ينبغي في حالات خطل الشم تجنب الأطعمة المقلية، واللحوم المشوية، والشيكولاتة،

والقهوة، والبيض، والبصل، والشوم، ويفضل تناول الأطعمة في درجة حرارة الغرفة أي باردة.

من المفضل استخدام بعض المكملات الغذائية المحتوية على الزنك، والأوميجا 3، والماغنيسيوم، والبيتاكاروتين، واستخدام قطرات الأنفية المحتوية على فيتامين A، وبخاخات الأنف، أو الغسولات الأنفية المحتوية على سيترات الصوديوم، وينصح البعض ببخاخات الستيرويدات، ولكن نظراً لآثارها الجانبية، فليست خياراً آمناً في كثير من الحالات، ولا بد من أن تكون تحت إشراف طبي.

على صعيد الأبحاث الحالية تجري دراسات حول استخدام إيفيرمكتين مضاد الطفيليات بمفرده، أو بالجム بينه وبين الأسبرين في علاج حالات فقد حاسة الشم، والإيفيرمكتين ليس بغرير عن أسماعنا فهو الدواء الذي وصف بالمعجزة في بدايات الجائحة، ثم عادت منظمة الصحة العالمية مؤخراً للتوصية بحصر استخدامه في إطار التجارب السريرية لعدم قطعية بياناته. حاستا الشم والتذوق تعملان بصورة وثيقة، وبالتالي فاستعادة حاستة الشم يتبعها استعادة حاستة التذوق بشكل متزامن.

الهجوم الأسود

بعد ما تردد في مصر بشأن وفاة الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم بمرض الفطر الأسود كأحد المضاعفات التي صاحبت إصابته مؤخراً وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بـكوفيد 19، ساد الخوف الأوساط الشعبية في مصر من تفشي السلالة الهندية الجديدة بمصر، والتي يتربع على عرش أعراضها الخطيرة والمميتة الفطر الأسود.

والفطر الأسود مرض ليس بجديد، فهو يصاحب ضعف المناعة ويهاجم الجهاز التنفسي بضراوة مسبباً ارتفاع معدل الوفيات لدى المصابين به ويحدث بسبب العفن الموجود بالتربة، وعبر المواد العضوية المتحللة من الأوراق المتعفنة ومصادر المياه الملوثة، ويمثل فصل الصيف المناخ المناسب له، حيث الحرارة والرطوبة، ويغزو جسم الإنسان عبر الأنف من خلال استنشاق الخلايا أو الجراثيم الفطرية (الأبوااغ)، وعبر الجلد مع الإصابات السطحية مثل جرح أو حرق. يسري هذا الداء النادر وغير المعدي والمميت في نفس الوقت عبر الجسم مسبباً تشوهات شديدة ونخر وموت الأنسجة التي تصبح سوداء في النهاية، وفي سبيل الحيلولة دون وصوله للمخ قد يلجأ الجراحون لاستئصال الأنسجة الميتة في الأنف والعين والفك العلوي.

ولكن لماذا يصاب مصابو كوفيد 19 بهذا الداء المميت؟! ذلك أن الأطباء كانوا يصفون مضادات الالتهاب (الستيرويدات) لکبح الاستجابة المناعية المفرطة التي يسببها كوفيد، والمسماة بعاصفة السيتوكين ما أدى إلى ضعف دفاعات الجسم وجعلها عرضة لغزو ونمو الفطريات. ثمة سبب آخر محتمل لهذه الإصابة الفطرية، وهو أجهزة ترطيب الهواء في وحدات العناية المركزة لمرضى كوفيد الخاضعين للعلاج بالأكسجين.

أكثر المعرضين للإصابة بهذا الخطر هم مرضى السكري؛ فارتفاع السكر لديهم وعدم انتظامه هو بيئه مناسبه لنمو هذه الفطريات علاوة على مرضي السرطان والمرضى المحتاجين لزرع الأعضاء.

من أعراض هذا المرض تورم الوجه وصداع وألم حول العينين وانسداد أو احتقان أو سيلان الأنف، مع تغير لونها نحو السواد وإفرازات أنيفية سوداء أو دموية مع ألم في الصدر، وعدم وضوح الرؤية وازدواجها. أما علاجه فيكون عبر مضاد الفطريات الأمفوتريسين بي والجدير بالذكر أن الكشف والعلاج المبكر يقيان من تعقد هذه الحالات بشكل كبير.

المخيبة حالياً من غزو محتمل للفطريات البيضاء والتي قد تصبح أكثر فتكاً وأشد وطأةً.

تجارب علاجية تنبئ بالنهاية

مع الإعلان عن سلالات جديدة من كوفيد 19 بالهند، وخروج النظام الصحي الهندي عن السيطرة، حيث سجلت الهند وفاة كل أربع دقائق بدل هي وسط خشية من امتداد الإصابات بهذه السلالات خارج الهند.

السلالات الهندية الجديدة: السلالة الهندية الأولى **B.1.617** والتي تحتوي على طفرة مزدوجة **E484Q** و **L452R**، مما يزيد المخاوف من زيادة انتشار العدوى.

السلالة الهندية الثانية **B.1.618** ذات طفرات ثلاثة ويزيد فيها قدرة **E484K** على الهروب المناعي بما يعني القدرة على الهروب من الأجسام المضادة وبالتالي يهدد مناعة المتعافين من كوفيد 19 ويزيد من رقة الإصابات على نحو غير مسبوق.

بعد هذه التحورات الجديدة عاد الجدل من جديد حول قدرة اللقاحات الحالية والتي تظهر يوماً بعد يوم على التصدي لهذه الطفرات والتي من الواضح أنها إلى ما لا نهاية، وهي مسألة طبيعية في عالم الفيروسات وتحدياته لذا بات السؤال هل التعجيل بدواء حاسم من شأنه أن يضع حدًّا لهذه الجائحة المستمرة؟!

دواء تجاري من إنتاج شركة فاينر يحيى الأمل من جديد في إمكانية السيطرة على الفيروس عبر الخيار الدوائي... هذا الدواء ليس بجديد فقد تم تطويره في السابق وتحديد عام 2003 إبان تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) ويستهدف الدواء إنزيم البروتياز **CL protease3** وللتتشابه الكبير بين سارس وكوفيد فقد بدأت التجارب عليه في حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي بشر بنتائجها الوااعدة في علاج كوفيد، حالياً اجتاز الدواء الواحد المرحلة المختبرية على الحيوانات، وببدأت تجاربه في المرحلة السريرية الأولى على المتطوعين وسط تفاؤل كبير خاصة وأن فكرة استهداف إنزيم البروتياز تستخدم في علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) والالتهاب الكبدي الوبائي (سي)، وحققت نتائج مثمرة وقد تسفر النتائج عن استخدام العقار منفرداً أو بالجمع بينه وبين مضاد الفيروسات ريتونافير والذي ينتمي لنفس العائلة.

وحتى نفهم الفكرة عن كثب فلا بد وأن نتطرق إلى دورة حياة الفيروسات بشكل عام.

تعد دورة حياة الفيروسات من المباحث الشيقية وفيها يرتبط الفيروس بسطح الخلية، ثم يدخل بداخلها وتنطلق منه مادته الوراثية (الرنا RNA) وحتى يتسرى للفيروس التكاثر فلا بد من تحول مادته الوراثية من الرنا إلى الدنا DNA حتى تندمج مادته الوراثية بالمادة الوراثية لنوءة الخلية المصابة

ويحول الخلية لمصنع لتكاثره وهنا يعمل إنزيم النسخ العكسي (**reverse transcriptase**) على مهمة تحويل الرنا إلى الدنا ثم يقوم الإنزيم المدمج (**integrase**) بدمج المادة الفيروسية وقد صارت دنا بالدنا الخاص بالخلية المصابة، ويتم إنتاج الرنا الفيروسي والبروتين اللازم لبناء فيروس جديد ويقوم الفيروس الوليد بالخروج عبر غشاء الخلية المصابة مغلفاً نفسه بجزء من غشائها ومتوجهًا لإصابة خلايا جديدة حتى يصبح بإمكان الفيروس فعل ذلك فلابد من أن ينضج في البداية والنضوج يتطلب إنزيم البروتياز والذي يقوم بقطع البروتينات بالفيروس لإعادة ترتيبها.

هذا الإنزيم الهام هو بيت القصيد الذي نحن بصدده في هذه التجربة العلاجية فهو العامل الأساسي في بناء سلاسل الأحماض الأمينية الفيروسية ومن ثم البروتينات الفيروسية وعرقلة هذه الخطوة في مهدها يمنع إنتاج فيروسات جديدة مكتملة النمو والنضج وبالتالي إيقاف الانتشار وهي تجربة نتمنى أن تكمل بالنجاح ويتوقف هذا المارد العنيف ويعود العالم لسابق عهده من الاستقرار الصحي المنشود.

كل ما تود معرفته عن لقاح سبوتنيك الروسي

مع إعلان مصر في أبريل الماضي اعتزامها تصنيع لقاح سبوتنيك لديها عبر شركة مينا فارم الدوائية المصرية بالاتفاق مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي المسؤول عن تسويق اللقاحات وأصبح هذا اللقاح حديث الناس وسط محدودية المعلومات العلمية عن فاعليته وأمانه.

في حرب ضروس خاضتها الدول الكبرى من أجل الاستحواذ على أسبقية طرح اللقاح الذي يضع حدًّا للجائحة كان الدب الروسي يحتسي نخب الانتصار مع تسجيله الأسرع للقاحه في 11 أغسطس عام 2020 لدى وزارة الصحة الروسية، حيث قام بتطوير اللقاح مركز غاليماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة وجاءت التسمية بسبوتنيك 5 تيمناً باسم أول قمر صناعي سوفيتي غزت به الفضاء عام 1957.

تعتمد فكرة هذا اللقاح على نواقل الفيروس الغدي (الأدينوفيروس) التي تسبب نزلات البرد الخفيفة لدى البشر، حيث تم إزالة مادته الجينية المسبة للعدوى ووضع شيفرة البروتين الشوكي المميز لكورونا لاستimulation وتحفيز الجهاز المناعي بجسم الإنسان على الاستجابة وإنتاج الأجسام المضادة ضده مما يقي من العدوى.

يستخدم اللقاح نوعين من الأدينوفيروس في جرعتيه حيث تحتوي الجرعة الأولى على **Ad26** مما يجعله شبيهاً بلقاح جونسون آند جونسون فيما تحتوي الجرعة الثانية على **Ad5** ليشبه في ذلك لقاح كاسينو الصيني المسمى تجاريًّا كونفيديسيبا.

فاعلية هذا اللقاح تصل نسبتها إلى **91.6%** وهو واحد من لقاحات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تخطت نسبة **90%**.

فيما يخص قدرة هذا اللقاح على التصدي للأشكال المتحورة من الفيروس فتشير الدراسات لقدرته على التعامل مع المتحور البريطاني **B117** بشكل جيد فيما يتضاءل بشكل ملحوظ مع المتحور الجنوب الأفريقي **B1351** أسوة بغالبية اللقاحات العاجزة عن التعامل مع هذا المتحور لكن لا توجد دراسات حتى الآن فيما يتعلق بفاعليته مع المتحور الهندي الأخير. كما طرح معهد غاماليا أيضاً لقاح سبوتنيك لait وهو جرعة واحدة فقط والمحتوية على **Ad26** وتبلغ فاعليته **79.4%** في اليوم الثامن والعشرين بعد التحصين وتنشد به روسيا تحقيق المناعة السريعة عبر تحصين عدد كبير من السكان والتصدير للدول التي تعاني تفشياً حاداً وتحتاج إجراءات على وجه السرعة، ولكنه في الوقت نفسه ليس بديلاً عن سبوتنيك **.5**.

يمكن حفظ اللقاح في درجة حرارة من 2-8 درجة مئوية مما يجعل فرصة توزيعه سهلة عبر العالم وخاصة بالدول النامية. فيما يخص أمان وسلامة اللقاح، فلا توجد أية بيانات حتى الآن حول تسببه في حدوث تجلطات على الرغم من دخول **EDTA** والأدينوفيروس في تركيبه كلقاحي جونسون آند جونسون واسترازينكا سواء بسواء، وقد تعرضنا لدورهما المحتمل في تكوين الجلطات في مقال سابق والحقيقة أن حرية تدفق البيانات والمعلومات وشفافيتها في دول مثل روسيا والصين تظل دائماً تحت دائرة الاستفهام والاتهام؟!

لكن نحتاج إلى مزيد من الطمأنة فيما يخص الناقل الفيروسي **Ad5** والذي تسبب في الإصابة بالإيدز لدى الرجال ذوي القابلية لذلك في بعض التجارب أثناء تطوير لقاح ضد الإيدز في 2008.

من الجدير بالذكر أن الشركة استخدمت اثنين من النوائل الفيروسية (الأدينوفيروس) في محاولة للتغلب على احتمالية تولد استجابة مناعية ضد الفيروس الناقل قبل تمكنه من إيصال شيفرة البروتين الشوكي، لكن يبقى السؤال، هل هذا كافٍ، وأنه لو أعطي اللقاح لشخص قد سبق إصابته بفيروس الأدينو المسبب لنزلات البرد وتشكلت لديه أجسام مضادة فلن يقلل ذلك من كفاءة اللقاح ويؤدي للفوز الجهاز المناعي لغالبية اللقاح؟! أسئلة وغيرها الكثير ربما تحمل لنا الدراسات الإجابة عنها.

آخر تطورات التجارب العلاجية لكورونا 19

تناولت في مقالات سابقة بالصحف العربية وفي أبحاث عدّة نشرت خلال الفترة الماضية بعدد من الكتب البحثية والثقافية تطورات التجارب العلاجية فيما يخص كوفيد 19 منذ بداية الجائحة وأغلب هذه التجارب تنصب على علاجات تقليدية قد تكون معروفة لدى شريحة واسعة من الناس وقريبة من الأذهان والأسماع بحكم شهرتها... عدد كبير من هذه الأدوية التقليدية شق طريقه وسط الصفوف ليصبح بالمقدمة لكن سرعان ما توارى مرة أخرى لأسباب عدّة بعضها يتصل بأعراضه الجانبية المفرطة والتي تفوق بطبيعة الحال الفائدة المرجوة وبعضها لأسباب تتصل بعدم ثبوت الفاعلية وبعضاها ظل عالقاً لا يمكن الجزم بفاعليته مع تضارب الأبحاث وأراء العلماء.

ومع استمرار الجائحة نظر في رحلتنا وسط هذه التجارب العلاجية والتي لن تنتهي على الأقل في الأفق القريب.

نبدأ رحلتنا مع العلاج بالبلازما حيث جاءت دراسة *Riley* *Recovery* البريطانية والتي نشرتها مجلة ذا لانسيت *The lancet* الشهيرة مؤخراً لتحسّم الجدل بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية العام الماضي حول نتائج علاج كوفيد ببلازما الدم للمتعافين من أنها ليست

حاسمة والدعوة لبقائها علاجاً تجريبياً، حيث أثبتت الدراسة أن العلاج بالبلازما لم يفلح في خفض نسبة الوفيات بعد مضي 28 يوماً من العلاج أو في خفض الحاجة للتنفس الصناعي أو في رفع نسبة التمايل للشفاء.

المحطة التالية مع الدواء الذي وصف في بداية الجائحة بالمعجزة والخارق إنه

إيفرمكتين **Ivermectin** مضاد الطفيليات الشهير والذي حصرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً في إطار التجارب السريرية لعدم قطعية نتائجه. بالطبع هذا تراجع مثير للخلاف ولكن الدراسات الحالية خاصة في الهند تدفع به مجدداً للمقدمة، ولكن ليس بمفرده هذه المرة، حيث أثبتت الأبحاث نجاعته بالجمع بينه وبين فلافوكسامين **Fluvoxamine** مضاد الاكتئاب المعروف والذي أثبتت الدراسات امتلاكه لخصائص قوية مضادة للالتهاب إضافة لدور واضح لمضاد الحساسية السيبروهيبتادين **Cyproheptadine** في مقاومة السيروتونين المتصاعد مع نشاط الصفائح الدموية الزائد في الرئة.

نأتي إلى ختام رحلة الحلقة وليس نهايتها ففصولها مستمرة كما أشرت سابقاً مع دواء الكوليسترون الشهير (**Statins**) والذي لا يخلو منه بيت من بيوت مرضى الكوليسترون والسكري والقلب والأوعية الدموية، فمنذ بداية الأزمة ولا تقطع أخباره السارة وأآخرها دراسة نشرت

في مارس الماضي في مجلة نيتشر **Nature** من كفاءة الستاتين في خفض نسبة الوفيات وخفض الحاجة لدخول وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

كل ما تود معرفته عن اللقاح الصيني سينوفارم

على الرغم من أسبقية هذا اللقاح في الظهور وتحمس دول كالإمارات والبحرين ومصر في استخدامه وعلى الرغم أيضاً من استخدامه حتى قبل انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، إلا أنه تراجع في مرتبته في قائمة اللقاحات في العالم؛ بسبب محدودية فاعليته التي تتراوح بين 72% - 79% أي لا يؤمن الحماية بدرجة عالية جداً على عكس نظائره من اللقاحات الإنجليزية والأمريكية، وهو باعتراف الصين ذاتها والتي تدرس مسألة خلط لقاحاتها أو إضافة جرعة ثالثة لضمان استمرار الجاهزية المناعية.

للقاح سينوفارم أو **BIBP** واحد من عدة لقاحات تطورها الصين، وطورته تحديداً شركة سينوفارم / المجموعة الوطنية الصينية للمستحضرات الصيدلانية، ويعتمد تكنولوجيا تقليدية وكلاسيكية قديمة منذ الخمسينيات من القرن المنصرم في صناعة اللقاحات، ذلك أنه يرتكز على حقن فيروس غير نشط، حيث تم عزل الفيروس من مصاب بمدينة ووهان الصينية، ثم العمل على إكثاره مختبرياً، وذلك بتحضيره في خلايا فيرو **vero cells** ويتم تعطيل نشاط الفيروس وتدمير محتواه الوراثي لإخماد

قدرته على التضاعف؛ باستخدام مادة كيميائية هي بيتا بروبيولاكتون عند درجة حرارة **2-8** مئوية ولمدة **48** ساعة، ويتم إعادة هذه الخطوة فضلاً عن إضافة مادة مساعدة هي هيدروكسيد الألمنيوم لتحفيز الاستجابة المناعية للقاح. بمجرد التطعيم باللقاح ودخول الفيروس المعطل ينبع الجهاز المناعي أجساماً مضادة تستهدف البروتين الشوكي وتمنع الفيروس من دخول الجسم كما تحفظ "خلايا النذكرة ب" بمعلومات عنه... ولكن يظل السؤال حول مدة استمرار الحماية ضد الفيروس؟!

إشكالية هذا اللقاح هي نفس إشكالية لقاح سبوتنيك الروسي من حيث القيود بدول المنشأ على سهولة تدفق المعلومات وإتاحة النتائج بشفافية تامة. لكن يمتاز بسهولة توزيعه ونقله حيث يحفظ في درجة حرارة من **2-8** مئوية.

يتألف اللقاح من جرعتين عن طريق العضل يفصلهما من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

تبعاً لمنظمة الصحة العالمية، فاللقاح لا يعطى للمراحل العمرية الأقل من **18** عاماً، في المقابل فقد أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لقاح فايزر بيونتيك للأطفال من عمر **12** عاماً، وعلى نفس الخطى تسعى شركة موديرنا.

فيما يخص تطعيم الحوامل فلا تجد منظمة الصحة غضاضة في ذلك حينما تفوق فوائد التطعيم المخاطر المحتملة، وينبثق رأيها من مأمونية التقنية التي يعمل بها اللقاح، وتبعاً لذلك لا تنصح المنظمة بإجراء اختبار الحمل قبل التطعيم أو تأجيل الحمل أو إجهاضه.

فيما يتعلق بالآثار الجانبية؛ فما تم رصده حتى الآن بسيط لا يتعدى احمرار وتورم موضع الحقن والصداع والإرهاق، وارتفاع درجة الحرارة وألم الأطراف، وهي أعراض تزول بعد فترة وجيزة.

أما ما يتعلق بقدرة اللقاح على التعامل مع المتحورات من الفيروس فيتعامل بشكل فعال مع المتحور الإنجليزي فيما تنخفض فاعليته مع المتحور الجنوبي أفريقي شأن باقي اللقاحات، ولا توجد دراسات مما يتعلق بفاعليته مع المتحور الهندي حتى الآن.

نأتي إلى سؤال هام يتعلق بالللقاحات ككل: هل ينبغي تحليل الأجسام المضادة بعد تلقي لقاح كوفيد للوقوف على مدى فاعليته؟ والإجابة لا جدوى مطلقاً، فهي ليست معياراً، وذلك بحسب توصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

ماراثون أعراض كوفيد19 (1)

مع كل موجة من موجات كوفيد 19 المستمرة التي تحط تباعاً على عالمنا تأخذ قائمة أعراض الفيروس في التمدد مضيفة مشكلات جديدة تجعل التحدي مستمراً ومؤثراً.

في البداية كانت الأعراض بسيطة الواقع على الآذان، غير أنها مع الوقت تبدلت لأعراض مستمرة الأثر ومحيفة التأثير.

من أعراض كوفيد 19: الحمى والصداع (يمكن علاجهما بالباراسيتامول) والسعال وألم العضلات وألم الصدر، والتعب والإنهاك والغثيان والقيء والإسهال والطفح الجلدي وتشوش التفكير.

وقد تعرضنا بشيء من التفصيل في مقال سابق عن فقدان حاستي الشم والتذوق وبعد ذلك من السمات المميزة للإصابة.

جميعنا خبر قشعريرة الحب وتوهج اللقاء الأول لكن شتان بينها وبين قشعريرة كوفيد 19 ولحظات الاستيقاظ من الارتجاف والرعشة المصاحبة للحمى، وقد عشتها مع إصابتي بـكوفيد في ديسمبر الماضي.

من الأعراض الأخرى سيلان الأنف وجفافها، وقد يمتد الجفاف بعد التعافي. كما سجلت بعض الحالات شلل بيـل: وهو شلل مؤقت في العصب

الوجهي نتيجة التهاب يصيب الأعصاب التي تحكم في عضلات الوجه مسببة تورمها.

ونظراً لأن العين من معابر كوفيد، وذلك لتوافق **PH** للفيروس مع **PH** للدموع، فالعين القرنفالية أو التهاب الملتحمة وضعف الرؤية والتهاب الشبكية، وتشنجات عضلات العين من أعراض الإصابة. من الأعراض المثيرة ما يسمى بـ**بلسان كوفيد** وهو طبقة بيضاء أو صفراء أشبه بالفرو مؤللة أحياناً والأكثر إثارة ما أدلى به بعض المتعافين من أن كوفيد كان المسئول عن سقوط أسنانهم.

من المعروف أن الفوّاق أو الزغطة يرتبط بالعدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا والهرس البسيط، أو الهرس النطaci، والعدوى البكتيرية مثل السل، لذلك فلا غرو أن نجد هذا العرض ضمن قائمة كوفيد وإن بدا نادراً، والزغطة هي تقلص الحاجز (العضلة الأساسية في الجهاز التنفسي والواقعة مباشرةً أسفل الرئتين وتفصل بينها وبين منطقة البطن)، بشكل لا إرادي بالطبع هي حالة تتعرض لها جميعاً، لكن استمرارها لأكثر من 48 ساعة هو مدخل للقلق ولابد من مراجعة الطبيب.

أما كوفيد 19 والجلطات فموضوع شائك بدأ مع الفيروس واستكمل حلقاته مع اللقاحات، وقد ربط الباحثون الروس بين دور الفيروس في

إحداث الجلطات وبين بروتين (فون ويلبراند **VWF**) في دماء المرضى والذي يعمل على التصاق الصفائح الدموية وتكوين الجلطات.

أما علاقة كوفيد 19 بمتلازمة غيلان باريه والتي يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب بدلاً من الجراثيم، مما يؤدي إلى إصابة الجسم بالشلل فلا زالت العلاقة تحت الدراسة بين مؤيد ومعارض، لكن تظل دروس التاريخ وعبره نصب أعين الباحثين فهذه المتلازمة أدت إلى توقف التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير عام 1976 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهل يمكن أن نغادر مبحثنا هذا دون أن نتطرق إلى أهم عرض إلا وهو ضيق التنفس ونقص الأكسجين، وقد استطاع الباحثون من جامعة ألبرتا التوصل إلى أن السبب في معاناة العديد من مرضى كوفيد من نقص الأكسجين هو زحف خلايا الدم الحمراء غير الناضجة التي لا تنقل الأكسجين من نخاع العظام إلى الدورة الدموية لتصل ل 60% (ال الطبيعي 1%) ومكمن الخطورة في ذلك أن هذه الخلايا هي هدف لهجمات كوفيد لاحتواها على مستقبلات **ACE2** وبروتين **TMPRSS2** علاوة على كونها في حد ذاتها مثبطة للمناعة عبر تثبيط إنتاج الأجسام المضادة ومناعة الخلايا التائية مما يفاقم خطورة الأمر.

ومن البالغين إلى الأطفال فقد سجلت الدراسات إصابة بعض الأطفال بمتلازمة كاواساكي (سبق الحديث عنها في كتابي جائحة العصر) علاوة على إصابات بمتلازمة الالتهابات المتعددة MIS-C والذي يصيب أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن أن يؤدي لمضاعفات بالقلب.

قد يمّاً قال ألبرت أينشتاين: "الخيال أهم من المعرفة" ولكن الجائحة أبت إلا وأن تعدل من مقولته الشهيرة ليكون الأصح الخيال مهم مع المعرفة فلا نهون من مخاطر الجائحة، ونخشى أن نواجه الناس بالاحتمالات فيتعاظم الخطب، ولا نهول منها بدرجة فجة تجعل الناس في درجة من القنوط يكون عندها الموت والحياة سيان، فالأمل باقي ولا ننس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمربيض: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ أَنْ يَشْفِيكَ (سبع مرات).

مارثون أعراض كوفيد 19(2)

في أزمنة الجوائح كن يقظاً أخي العزيز واضعاً كل الاحتمالات نصب عينيك، هذا ليس للقارئ وحسب، بل لصانع القرار في المقام الأول وللممارسين الصحيين الذين يحملون على عاتقهم مهام جليلة في ظرف استثنائي شديد الدقة، فالفيروس يأبى إلا ويعطينا دروساً قيمة في فن إدارة المخاطر الصحية وهو من العلوم الرائعة التي لا غنى عن إجادتها وتطبيق نظرياتها.

من المخاطر التي يتعدد صداها بين صفحات الدراسات في الفترة الأخيرة احتمالية حدوث الشلل الرعاش (باركنسون) لدى مصابي كوفيد 19 نظرية حفتها مخاوف من تكرار ما حدث إبان الأنفلونزا الإسبانية عام 1918 وما تلاها بعد سنوات قليلة من تضاعف حالات باركنسون بنحو ثلاثة أضعاف !!

بداية ما هو مرض باركنسون؟

هو مرض عصبي يؤثر في حركة الجسم مسبباً رعشة وتييس العضلات، وقد اتخذت الجمعية الأوروبية لباركنسون زهرة الخزامي الحمراء البيضاء رمزاً لمكتشفه، حيث يعود الفضل في اكتشافه للطبيب الإنجليزي جيمس باركنسون عام 1817، أما السبب في حدوثه ففي أشهر النظريات نتيجة

لتراتكم بروتين **α syncuclein** ما يحدث نقصاً في الدوبامين وهو الناقل العصبي المسؤول عن حركات الجسد.

ولكن كيف يستطيع كوفيد 19 إحداث باركينسون في مرضاه إذن؟
تشير الدراسات إلى إحداث كوفيد 19 تغييرات في بنية بروتينات الرئة لدى المصابين مما يلحق بها الخلل فتنقل خارج الرئة إلى الدماغ عبر آلية

exosomes وهناك ترتبط ببروتينات الجهاز العصبي المركزي مسببة الخلل بها وتحديداً بروتين **Rab7A** وهو بروتين صغير لكن له فائدة

- عظيمة في تنظيف الخلايا والتخلص من ترسبات **α syncuclein** - والذي أشرنا له كسبب لباركينسون - وبالتالي فالخلل الذي أصاب هذا البروتين الصغير يعرقل دوره في التنظيف ويفتح الباب على مصراعيه للإصابة بباركينسون.

هذا في إحداث باركينسون من العدم، فماذا عن تأثير كوفيد 19 على مرضى مصابين بباركينسون بالفعل؟ بالطبع التأثير مزعج للغاية صحيح أن مرضى باركينسون لا يعانون ضعفاً بالجهاز المناعي لكن تراجع وظائف العضلات لديهم ومنها عضلات الجهاز التنفسي تزيد من صعوبة التنفس بعمق للتزويد بالأكسجين الكافي للرئتين مما يزيد من مخاطر المضاعفات عند

إصابتهم بـكوفيد فضلاً عن أن باركنسون مرض غالبية مرضىه من كبار السن وهو ممكّن للخطورة المضاعفة. نأتي إلى عرض آخر لا يقل إزعاجاً، وهو علاقة كوفيد بالخصوصية لدى الرجال.

وهنا تتأرجح الدراسات بين مؤيد لمسؤولية الفيروس عن تدهور جودة السائل المنوي حتى ستين يوماً بعد الإصابة، وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة، وتعرضها للتتشوه والانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، فيما حاول بعض العلماء وضع احتمالات لهذا التأثير الضار على الخصوبة بمفازاة عن الفيروس القابع دوماً في قفص الاتهام من بينها السمنة لدى بعض مصابي كوفيد 19 أو بسبب الأدوية التي يتعاطونها كالفايفيرافير مثلاً - وهو الدواء الياباني الشهير المعروف بالأفيجان، وقد دخلت في تجربة سريرية للعلاج به عند إصابتي بـكوفيد في ديسمبر الماضي وكان الإقرار **informed consent** يتضمن أعراضه بوضوح - لكن الواضح أن الفيروس له قدرة على مهاجمة خلايا الخصية والتضاعف بها ملحقاً بها الضرر بشكل أو بأخر، لذلك من الأفضل فحص القدرة الإنجابية للمتعافين من فيروس كوفيد 19.

ثمة سؤال هام تجذب عليه الإيجاب ما السبب الذي يجعل بعض المرضى يصابون بأعراض بالجهاز الهضمي فيما لا يتعرض البعض الآخر لها؟ الإجابة

على هذا السؤال تبدو في عاداتنا الغذائية الخاطئة والتي قد تقضي على البكتيريا الطبيعية النافعة التي تعيش في المعدة والأمعاء، مثل **Bifidobacteria** والتي تمتلك تأثيراً مضاداً ل Kovifid 19 لكونها تتصدى لعاصفة السيتوكينات التي يحدثها الفيروس مما يفتح المجال أمام دور محتمل للمعززات الحيوية **probiotics** لتكون من الخيارات الوقائية ضد Kovifid 19.

مارثون أعراض كوفيد 19 (3)

ثمة سؤال هام يطرحه البعض حول كوفيد 19، لماذا يرافقنا الصداع كصديق حميمي بعد الإصابة ولمدة طويلة؟

يمتاز الصداع المصاحب لكوفيد بسمات مميزة جعلته يطلق عليه صداع كورونا؛ فهو صداع متدرج من معتدل إلى حاد القوة يتبعه شعورٌ بنبض أو ضغطٍ على جانبي الرأس، ويزداد في السوء عند الانحناء.

والتفسيرات تجنب في اتجاه خلايا الدم المونوسيلت غير الكلاسيكية والتي تقع في أجساد المتعافين بعد مضي 15 يوماً من الإصابة، وهي قادرة على الالتصاق ببطانة الأوعية الدموية وعبر الحاجز الدماغي الوعائي والالتحام بمستقبلاتها مسببة الالتهاب عبر تحرير الكيموكتين دلتا 1 fractalkine/CX3CL1 وهو من عائلة السيتوكتينات الالتهابية الصغيرة، ويعمل على توسيعة الأوعية الدموية مسبباً الصداع.

وهل هذا هو التفسير الوحيد لهذا الصداع؟ وماذا عن باقي الأعراض الأخرى؟

بالطبع إلصاق التهمة بعاصفة السيتوكين التي يتمخض عنها الفيروس كسبٍ رئيسٍ لكن ليست وحدها السبب، فقد كشف العلماء مؤخرًا علاقة تربط بين فيروس كوفيد 19 وفiroس Epstein-Barr أو فيروس الهرس البشري المسبب للحمى الغدية، حيث وجد هذا الفيروس في فحوص الدم لمصابي كوفيد 19 ومن أعراضه الإرهاق الشديد والطفح الجلدي، والصداع والحمى، وقد يمتد أثره ليطال الطحال مضخماً إياه والكبد مسبباً انتفاخه وهو ينتقل عبر سوائل الجسم كاللعاب والدم والسائل المنوي. بالطبع تبدو أعراضه للوهلة الأولى ليست خطيرة وعادة ما يتحسن مرضاه في غضون أسبوعين إلى شهر، لكن إشكاليته الحقيقية في كونه فيروس مؤبد، فقد تصاب به وتعافي لكنه لا يرحل ويبيقى كامناً ومنتظراً لمن يعيده تنشيطه من جديد، وربما كانت قدرة كوفيد على تحفيز هذا الفيروس هي السبب في ملازمة بعض الأعراض كالإرهاق والطفح الجلدي والصداع لبعض المرضى.

الحقيقة أنّ حلقة اليوم ربما يغلب عليها كثير من السوداوية لذا نزاماً أن نطرح أمراً فيه كثير من الطرافـة والدعابة، وقبل أن نمضي في طرفتنا العلمية نطرح سؤالاً، هل سمعت يوماً عن الجاشنـكير؟

ربما قرأت في التاريخ المملوكي لتعرف معنى هذه الوظيفة الهامة في حياة الحكام والسلطانـين، ألا وهي وظيفة متذوق الأطعمة وهي ليست بالوظيفة

السهلة فعلاوة على كونها وظيفة خطرة قد تودي بحياة صاحبها إذ من واجباته أن يتناول الأطعمة والأشربة قبل السلطان أو الملك حذر الموت بالسم الرعاف، فهي أيضاً وظيفة تعتمد على الذوق الرفيع، وحديثاً اكتشف الباحثون جين مستقبلات الطعام المر ويسمى **TAS2R38** والذي عادة ما يحمل المرء نسخة واحدة منه، ولكن حينما يجتمع للشخص نسختان من هذا الجين من أبويه هنا نطلق عليه الذوقة!

وقد وجد أن تنشيط جين مستقبلات الطعام المر يؤدي إلى تعزيز المناعة عبر إنتاج أكسيد النيتريك الذي تحركه أيونات الكالسيوم، وكلاهما له دور مناعي؛ فأكسيد النيتريك قادر على تدمير الميكروبات وأيونات الكالسيوم تحفز الخلايا التنفسية لإطلاق مضادات الميكروبات.

لقاحات كوفيد ومرضى في مرمى الخطر

كما كان كوفيد متهمًا في بداياته بكونه عنصريًاً وذا نزعةٍ دروانيَّةٍ تنتصر لبقاء الأقوى والأصلح وتناهض حياة الضعفاء من كبار السن ومرضى الحالات المزمنة، وهو ما اتضح عدم صوابه مع مر من أحداث تماماً كالفهم الخاطئ لما نسب لداروين سواءً سواءً، فالاتهامات نفسها تداعب مخيلة البعض حول لقاحات كوفيد 19 وتأثيراتها على الأمراض المزمنة والخطرة ونستعرضها فيما يلي:

١- لقاحات كوفيد ومرضى السرطان.

قد لا تتوفر دراسات كافية عن مدى أمان وفاعلية اللقاحات بدرجة كافية ترسِي قواعد الثقة وتزيل تلال من الخوف والقلق لدى مرضى السرطان تحديداً على الرغم من الاعتقاد بكون اللقاحات آمنة تماماً خاصة وأنَّ أغلب الدراسات في هذا المضمار تدور في فلك لقاحات فايزر بيونتك وموديرنا وبقي اللقاحات غائبة أو تخطو على استحياء لكن تبقى كفة فوائد اللقاحات تعلو ما سواها من مخاطر، كما أنه لزام التشاور مع مقدمي الرعاية الصحية لتحديد الوقت الملائم للحصول على اللقاح.

تحدث دراسة بكلية ألبرت أينشتاين للطب بالولايات المتحدة الأمريكية عن نتائج مشجعة بشأن تزايد الأجسام المضادة بمضي الوقت

بعد تلقي الجرعة النهائية من لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون لدى **٩٤** في المائة من مرضى السرطانات.

يتربع على قمة مرضي السرطان الأشد خطورة عند إصابتهم بـكوفيد حيث تزيد الحاجة لدخول المستشفى وترتفع معدلات الوفاة: مرضي سرطان الرئة فلا ينبغي أن ننسى أن كوفيد مرض تنفسي في الأساس علاوة على سرطان الدم الليمفاوي المزمن الذي يتسبب في ضعف المناعة.

الإسراع من الجرعة الثانية للقاح لمرضى السرطانات وضعهم على الأولوية أمر شديد الأهمية حيث تشير دراسة بريطانية إلى أن لقاح فايزر بيونتك يوفر حماية أقل لمرضى السرطانات الصلبة، مثل: سرطان الثدي، والبروستاتا، وسرطان الدم، مثل اللوكيميا، وذلك بعد الجرعة الأولى من اللقاح مما يتطلب تعزيز الحماية بجرعة ثانية مبكرة في غضون **٢١** يوماً لا أكثر.

من المعروف عن لقاح فايزر بيونتك تسببه في حالات مؤقتة من تضخم الغدد الليمفاوية لكن هذا العرض تحديداً كان مثيراً للقلق والرهبة لدى مريضات سرطان الثدي اللاتي تعافين بعد استئصاله من أن يكون عالمة على عودة المرض الخبيث، لذلك لابد من طمأنتهن مع التوصية بأخذ اللقاح في الذراع المقابل للثدي المستأصل وفي حالة استئصال الثديين ينصح بأخذ

اللماح في منطقة الفخذ أو الورك مع إجراء التصوير الشعاعي للثدي قبل التطعيم أو بعده بمدة من 4 إلى 6 أسابيع.

من التوصيات الضرورية لمرضى الأورام لكن بالطبع بعد التباحث والمشاورة مع مقدمي الرعاية الصحية تأخير اللماح في حالات اللوكيميا الحادة لما بعد الانتهاء من جلسات العلاج الكيميائي المكثف والتي تعطى كعلاج تحريضي في هذه الحالات.

كما ينبغي الانتباه إلى ضرورة مرور وقت كافٍ من 5-7 أيام من آخر جلسة للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو العلاجات المثبتة للمناعة حيث يكون معدل خلايا الدم البيضاء منخفض مما قد يوقع المريض في براثن الحمى.

٢- لقاحات كوفيد ومرضى الكلى.

لشدة ما كان طالع مرضى الكلى مبهجاً حينما تناقل العالم أن أول من حصل على اللماح بالعالم وتحديداً لقاح استرازينيكا الإنجليزي الشهير هو بريان بينكر البالغ من العمر اثنين وثمانين عاماً، والخاضع لجلسات الغسيل الكلوى بمستشفى تشرشل مما ولد الثقة العملية لديهم في أمان اللماح ولو بشكل مبدئي.

تشير التوقعات لأمان اللماح في هذه الحالات لكن تفرق الدراسات بين المرضى الخاضعين للغسيل الكلوى والآخرين الذين أجروا عمليات زرع

الكل، حيث أوضحت دراسة لجامعة جون هوبكينز في مارس 2021 أن متلقى الزرع قد أنتجوا 17 في المائة فقط من الأجسام المضادة المعادلة للفيروس بعد الجرعة الأولى من اللقاح، وما لبثت أن ارتفعت النسبة إلى 54 في المائة بعد الجرعة الثانية وهو مستوى من الحماية متواضع إذا ما قورن بمرضى الغسيل الكلوي الذين أحرزوا 88.9 في المائة بعد الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك بحسب دراسة نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكل، كما أن استجابة الخلايا التائية كانت جلية لدى 100 في المائة من مرضى الغسيل الكلوي في مقابل 57.8 في المائة من مرضى زرع الكلى وتذهب بعض التفسيرات لانخفاض الحماية لدى مرضى الزرع لاحتمالية تداخل مثبطات المناعة التي يستخدمها هؤلاء المرضى لتعضيد العضو المزروع مع قدرة الجهاز المناعي بالجسم على إنتاج الأجسام المضادة التي تحمي من كوفيد 19، مما جعل بعض الدراسات توصي بجرعة ثالثة من فايزر بيونتك أو جرعة إضافية من لقاح جونسون آند جونسون. نأتي إلى أسئلة عادة ما تتناقلها الألسن وأواجهه كثيراً منها على صفحتي على الفيس بوك، أو في تساؤلات بعض أصدقائي ومنها هل اللقاحات تسبب العقم؟ والإجابة في حدود المتاح من معلومات: لا يوجد علاقة حق الآن ومن الأسئلة الأخرى هل يوجد تعارض بين لقاح كوفيد ولقاحات أخرى؟

والإجابة أنه يوصى بإعطاء لقاح كوفيد منفرداً والفصل بينه وبين أي لقاح آخر سابق عليه أو لاحق عليه بمدة لا تقل عن أسبوعين. وفيما يخص التخطيط للحمل بالنسبة للنساء الالاتي حصلن على اللقاح؛ فالأفضل الانتظار مدة لا تقل عن ثلاثة شهور بعد الجرعة الثانية للشروع في ذلك. السؤال الأخير والذائع الشيع، هل ننجي الكمامات جانباً بعد أن نتلقى جرعتي اللقاح؟ الإجابة لا. ذلك أن فرص الإصابة بعد اللقاح واردة جداً خاصة مع اللقاحات الصينية، والتي لم تمنع كثرة الإصابات بالبلدان التي اعتمدتتها والتي تدرس إضافة جرعة ثالثة، وقد تحدثنا عن ذلك من قبل إضافة أن الهواء كوسط ناقل لكوفيد مسألة صار لها ما يؤيدها وينبغي الحرص في المناطق المزدحمة المتواجد بها حبوب اللقاح أو الطلع الذي تنتجه الأشجار، حيث أثبتت دراسة للمعهد الأمريكي للفيزياء نشرت في دورية فيزيكس أوف فلوييد قدرتها على نقل الفيروس لمسافة أبعد من التي ينتقل بها كوفيد عبر العطاس هذه الدراسة حاسوبية وقائمة على محاكاة الواقع ولو أكدتها دراسات أخرى، فمن شأن ذلك تغيير قواعد التباعد المجتمعي القائم حالياً على مترين فأكثر ليكون أبعد بكثير علاوة على أن عادات الكثيرين في التريض بين الأشجار والزهور سعيًا لاستنشاق نسمات الصباح لتداعب أنوفهم بالهواء النقي المحمل بالأكسجين، ستصبح على قائمة الممنوعات فالهواء سيكون مفعماً بالخطر وحاملاً للفيروسات حقاً.

لقد جاء كوفيد ليدمّر لوحات جميلة نخطها بسداد حياتنا مستبدلاً إياها
بكمامة تعلو أنوفنا وتكتم أفواهنا.

الجديد مع الفيروس المتمرد

مع نهاية عام 2021 شهد العالم متحوراً جديداً هو متحور "أوميكرون" وسط تخوفات من سرعة انتشاره وشدة ومن أعراضه الشائعة: التعب وألم العضلات، والحلق المتشنج، والتعرق الليلي.

وفي إسرائيل ظهرت حالة نادرة من العدوى المتزامنة لفيروس كورونا والأنفلونزا معاً أطلق عليها "فلورونا".

أما على صعيد الخيارات العلاجية فasad العالم التفاؤل مع ظهور دوائين فمويين لكوفيد 19 الأول هو باكسولوفيد والثاني هو مولنوبيرافير والاثنان من مضادات الفيروسات التي تستهدف الجزء المسؤول عن تكاثر الفيروس.

وعلى صعيد الطرائف العلاجية فقد توصل العلماء من جامعة بنسلفانيا إلى صناعة علقة مغطاة ببروتين نباتي وتحتوي على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) بما يشبه المصيدة للفيروس مما يقلل الحمل الفيروسي أي كمية الفيروس وتواجده في اللعاب.

كوفيد 19 المستجدات الأخيرة (2022)

من المصطلحات التي دخلت القاموس الطبي حالياً ما يعرف بـ(كوفيد طويل الأجل) في إشارة للأعراض طويلة الأمد التي تصاحب متحوري أو ميكرون بنسبة أعلى ودلتا بنسبة أقل.

وهذا يرجع للقدرة الأعلى لأوميكرن على الإفلات من الجهاز المناعي مما يعني أن الجرعات الحالية من اللقاحات ولو وصلت لأربعة، لن تكسب الحماية الكاملة من إصابات لاحقة بمحورات فرعية.

ومن أشهر هذه الأعراض تلك المرتبطة بالمخ حيث تشير الدراسات إلى معاناة مصابي كوفيد من ضبابية في الدماغ أو الضباب العقلي، حيث قلة التركيز وتراجع الوظائف الذهنية، كالانتباه والتركيز والذاكرة فضلاً عن انكماش المخ (في أقرب السيناريوهات لما حدث لوالدي رحمة الله)، وتقليل المادة الرمادية في مناطق التحكم بالذاكرة والعاطفة وإتلاف الأجزاء المتحكمة في حاسة الشم، كما يحدث انخفاض في خلايا أوليغوديندروسيتيات التي ترسل أذرعها إلى الأعصاب أشبه بالعنكبوت مغطية إياها بمادة دهنية تسمى الميالين توفر الحماية للأعصاب، وكذلك نقل الإشارات عبر العصب.

من الأعراض الأخرى الوهن العضلي الشديد والذي ترجعه الدراسات لتكون خثرات صغيرة بالأوعية الدموية وحدوث خلل بطبقة البطانة التي تغلف الأوعية الدموية وتتضمن سلامتها.

ومن حديث الأعراض إلى آخر أخبار اللقاحات، فقد حصل لقاح فالنيفا الفرنسي على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية، وهو لقاح يعتمد فيروس غير نشط بشكل كامل وعلى الرغم من كونه لقاح تقليدي إلا أنه أنتج أجساماً مضادة أكثر تحبيداً للفيروس من لقاح أسترازينيكا بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية مع أعراض جانبية أقل في موضع الحقن.

وأما وقد تحدثنا عن موضع الحقن فنعالوا معاً نتحدث عن دراسة طريفة أجريت على الفئران ونشرتها مجلة ساينس والتي خلصت أن إعطاء جرعة اللقاح الثانية بنفس الذراع الذي أعطيت به الأولى يعمل على تنشيط **Germlinal center (GC)** وهي المراكز المحتوية على خلايا الذاكرة **B cells** المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة، وهو ما من شأنه استدعاء أفضل لهذه الخلايا ومنح مناعة وقائية طويلة الأمد لذا فربما تصبح مسألة مراعاة مكان التحصين من استراتيجيات التطعيم القادمة.

على صعيد علاقة كوفيد 19 بالسرطانات، فقد أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى أن كوفيد ليس مرضًا للجهاز التنفسي فحسب، بل أيضاً مرض للأوعية الدموية في المقام الأول لذا نجد مرضى سرطان الدم الأكثر خطراً

للإصابة بعذوى كوفيد 19 الشديدة، كما تزيد عذوى كوفيد 19 من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

لذا من المفيد أن نعود قليلاً للوراء وأن نتذكر سوياً مجموعة statins ذاتعة الصيت والمستخدمة في علاج الكوليسترون والتي تعرضت لها في مقالات سابقة عن دور محتمل لها في الحد من كوفيد والآن أشير لها لدورها في الحد من السرطانات ووقف انتشارها خاصة بعد سن الأربعين وفي مقدمة هذه المجموعة أتورفاستاتين ويعود السبب أن مجموعة statins تعمل على تثبيط بروتين مهم تحتاجه الخلايا السرطانية للانتشار ألا وهو

.MACC1

فيما يتعلق باستراتيجيات الحماية والوقاية كما أشرنا لذلك في مقالات سابقة، ولأن الأسطح من ناقلات العذوى فقد اختبرت الدراسات قدرة الأسطح المغطاة بمعادن لها خصائص مضادة للميكروبات كالنحاس والفضة لتكشف قدرة النحاس على مقاومة الفيروسات وقتلها مقارنة بالفضة. إذاً كان الصينيون محقين حينما استخدمو العملات النحاسية سنة 1600 قبل الميلاد في علاج أمراض المعدة والمثانة والقلب بحسب مجلة سميثسونيان. نمضي إلى طرائف الكشف عن كوفيد 19 وإمكانية استخدام الكلاب المدربة في المطارات بكفاءة ودقة تصل لتسعين بالمائة.

نأى إلى الأمور التنظيمية التي أحاطت بالجائحة واستحداث جوازات السفر الصحية حول العالم كدليل على تلقي اللقاح وجعلها شرط للسفر حول العالم وهي بالنسبة ليست المرة الأولى، ففي تسعينيات القرن التاسع عشر فرضت بريطانيا على مستعمرتها في الهند شهادة تلقي اللقاح ضد الطاعون للتضييق على حركة السفر وهو ما جوبه وقتها بمعارضة هندية كبيرة.

ولأننا على اعتاب انفصال هذه الأزمة وربما يكون هذا آخر مقال لي عنها، فلا يسعني أن أختتم هذا البحث دون أن أذكر بحركات القرصنة الحديثة بين الدول الغربية والتي اشتعلت وتيرتها في الفترة الأولى من الأزمة، فالولايات المتحدة تستولي على الأقنعة الطبية الموجهة للشرطة الألمانية وفرنسا تستولي على ملايين الأقنعة والقفازات الطبية وهي في طريقها لإيطاليا وإسبانيا، والتشيك تصادر مساعدات من بينها أجهزة تنفس اصطناعي موجهة لإيطاليا وتركيا تستولي على أجهزة تنفس اصطناعي وهي في طريقها لإسبانيا. بالطبع لا نلوم الدول؛ فالجواب ثُقُدُّ كثيراً من الدول أعصابها، بل وتشعل الثورات فيها ألم تكن الأنفلونزا الإسبانية التي حصدت أرواحآلاف المصريين عام 1918 وتداعياتها الاقتصادية سبباً في اندلاع ثورة 1919؟!

لكن في المقابل مصر الحاضر نجدها تستعيد مجدها التاريخي في مساعدة الجوار فترسل مساعدات للصين والسودان والولايات المتحدة وإيطاليا

وغيرها وهو غير المستغرب على مصر التاريخية أيضاً في وقت الشدائـد والمحن ففي ديسمبر عام 1931 أوفـدت مصلحة الصحة المصرية (كانت تابعة لوزارة الداخلية آنذاك)، بعثة طبية إلى الصين مؤلفة من الدكتور حسين إبراهيم البكتيرولوجي الاختصاصي في التطعيم، ومحمد أفندي الهواري، وإمام أفندي السرجاني، مساعدـين للطبيب وبصحبـتهم لقاح الكولـيرـا ومـعمل مجـهز مـتنـقل، وجاء ذلك بعد انتشار الأمـراض الفتـاكـة في الصين كالـكـولـيرـا والـجـدرـي والـدوـسـتـارـيا، وزـادـ من وـطـأـتهاـ الفـيـضـانـ الذي اجـتـاحـهاـ ما جـعـلـهاـ تـلـجـأـ لـعـصـبةـ الـأـمـمـ طـلـبـاـ لـالـمـسـاعـدةـ فـتـبـادرـ لهاـ يـدـ مصرـ. إنـهاـ صـفـحـاتـ منـ الـعـلـمـ الـمعـطـرـ بـالتـارـيـخـ الـذـيـ لـابـدـ وـأنـ يـبـقـىـ وـتـنـظـلـ صـفـحـاتهـ النـاصـعـةـ عـلـىـ الـأـجـيـالـ الـقادـمةـ.

الدراسات

الدراسة الأولى

جائحة كوفيد-19 .. خيارات علاجية

محمد فتحي عبد العال

ماجستير الكيمياء الحيوية جامعة الزقازيق

رئيس قسم الجودة بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية بمصر سابقاً

dr_mfathy2005@yahoo.com

المدخل

تعدجائحة كوفيد - 19 واحدة من التحديات التي تواجه البشرية في وقتنا الحاضر فمنذ ظهوره في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان جنوب الصين واجتاح جميع أرجاء العالم بوتيرة سريعة مسبباً العديد من الإصابات والوفيات.

ويجري حالياً عزل المرضى المشتبه في إصابتهم للحيلولة دون انتقال العدوى للآخرين.

ويُسخر العالم جهوده الآن من أجل التوصل إلى لقاح يحفظ حياة البشرية من هذا الفيروس المرعب فضلاً عن إيجاد علاج ناجع يضع حدًا لمعاناة المصابين ويحفظ حياة من شارفوا على الموت.

الكلمات المفتاحية: فيروس كورونا المستجد، COVID-19، متلازمة الجهاز التنفسى، الفيروسات التاجية.

بحث نشر في الكتاب المحكم

الأمن الصحي كأحد مهددات الأمن القومي والمجتمعي العالمي الصادر عن المركز الديمقراطي العربي بألمانيا.

المقدمة:

الفيروسات التاجية هي زمرة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء (1). سبع فيروسات من هذه المجموعة بإمكانها نشر العدوى بين البشر حول العالم، ولكنَّ أربعًا منها تجلب أعراضًا بسيطة وهي (2): E,NL63,OC43 and HKU1229 السلالة فأوها المسؤول عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS) والذي ظهر بالصين عام 2003 ويليه المسؤول عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) والتي ظهرت بالمملكة العربية السعودية عام 2012 وأخرها كوفيد - 19 الذي يجتاح العالم حالياً (2).

وقد أعلنت اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات تسمية "فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم" (SARS-CoV-2) اسماً رسمياً للفيروس الجديد في 11 شباط/فبراير 2020. واختير هذا

الاسم لارتباط الفيروس جينياً بفيروس كورونا الذي سبب فاشية متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) في عام 2003. غير أن الفيروسين مختلفان رغم ارتباطهما الجيني. وأعلنت المنظمة بدورها أن "كوفيد-19" هو الاسم الرسمي لهذا المرض الجديد في 11 شباط/فبراير .(1,3) 2020

يصيب الفيروس المستجد الجميع صغاراً وبالغين، ولكن تتفاوت درجات خطورة الإصابة تبعاً للعمر، فكلما زاد العمر زادت الخطورة وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فالفئات الأكثر خطورة هي أصحاب الأمراض المزمنة (الكلى- الكبد- أمراض المناعة- السمنة- القلب- الأنيميا المنجلية)، ومرضى الربو، وضغط الدم، ومرضى السكري من النوع الأول والثاني، وحالات الحمل، والمدخنون ونزلاء دور المسنين والأطفال المصابون بأمراض جينية أو عصبية أو وظيفية (4).

وينتقل فيروس كوفيد عن طريق الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم المصاب بالعدوى عند التحدث أو العطس والسعال وأضيف إلى ذلك الهواء مؤخراً وعن طريق العين، حيث حذرت دراسة من كلية الطب جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة من أن الدموع الملوثة بالفيروس قد تكون مصدراً للعدوى وقد عمل الباحثون ذلك بامتلاك العين لمستقبلات ACE

والمحوجة بالرئتين أيضاً والتي يستهدفها الفيروس مما يصيب مرضى كورونا بتهيجات العين والتهاب الملتحمة وأنّ مسحات العين قد دلت على وجود الفيروس في العين لمدة 27 يوماً بعد الأعراض الأولية للإصابة بالمرض ويأتي في المرتبة الأخيرة البراز، ويعرف ذلك ب **Fecal oral transmission** وذلك وفقاً للاحظات المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من وجود الفيروس ببراز مرضى كورونا، وهو ما اعتبروه أمراً طبيعياً، حيث من الممكن أن يتلعل الشخص لعابه الملوث بالفيروس فيدخل للمعدة والأمعاء ومنها للبراز (1). ويستغرق الوقت بين التعرض وظهور الأعراض ما بين يومين و14 يوماً، بمتوسط خمسة أيام.

وتشمل الأعراض الشائعة: الحمى، والسعال، والعطس، وألام الحلق، وضيق التنفس، والصداع، وأوجاع الجسم والعضلات، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وقد تؤدي إلى أعراض أكثر تعقيداً كالالتهاب الرئوي مؤخراً أضاف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي (CDC) ثلاثة أعراض جديدة هي سيلان الأنف أو الاحتقان والإسهال والغثيان (1,2,4).

لا يوجد علاج محدد حتى الآن للفيروس كما تجري الاختبارات على قدم وساق من أجل الوصول إلى لقاح يوفر الحماية للبشرية من هذا الفيروس.

وتتركز الجهود الحالية على تنمية الثقافة المجتمعية تجاه مجموعة من التدابير الاحترازية ومنها: غسيل اليدين بالماء والصابون، والحفاظ على مسافة مترين أكثر من الغير، وعزل المشتبه في إصابتهم لمدة أربعة عشر يوماً (٤).

- 1.WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) July 2020.Available at <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>.
- 2.Ahmad S, Hafeez A, Siddqui SA, Ahmad M, Mishra S. A Review of COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) Diagnosis, Treatments and Prevention. EJMO 2020;4(2):116–125.
- 3.Singhal, T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr (2020).
<https://doi.org/10.1007/s12098-020-03263-6>.
- 4.Center for disease control and prevention, corona virus disease 2019 (COVID-19).
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.

فضلاً عن تعزيز المناعة عبر الغذاء الصحي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات، ويحتل فيتامين (سي) وفيتامين (د) والزنك قائمة

الأدوية المفضلة لهذا الغرض. يتوافر فيتامين (سي) في مصادر طبيعية كالحمضيات والتوت والطماطم واللفلف والبروكلي والسبانخ (١). بحسب موقع مايو كلينيك الشهير فالجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي للبالغين الرجال **٩٠** ملجم، وللسيدات البالغات **٧٥** ملجم، على ألا تتجاوز **٢٠٠٠** ملجم يومياً، حيث تؤدي الجرعات العالية منه إلى الإسهال والغثيان والقيء، وحرقة المعدة والصداع والأرق، وتكون حصوات على الكلى (١).

أما فيما يخص الزنك وهو يتوافر طبيعياً في الدجاج واللحوم الحمراء، كما يتوافر في البقوليات كالعدس وفي المكسرات كالكاجو، وبحسب نفس الموقع فالجرعة الموصى بها من الزنك للبالغين من الرجال **١١** ملجم، وللسيدات **٨** ملجم على ألا تتجاوز الجرعة اليومية **٤٠** ملجم (٢).

أما فيما يخص فيتامين (د) فهي دراسة أمريكية أولية بجامعة نورث ويسترن وجدت علاقة بين مستوى فيتامين (د) ومعدلات الوفيات جراء كوفيد-١٩، وبحسب الدراسة فالأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين (د) كانت فرصتهم في النجاة من مضاعفات كوفيد-١٩ أكثر وفرة بالمقارنة بمن لديهم مستوى منخفض من فيتامين (د) والذين كانوا الأكثر عرضة للوفاة بـ كوفيد-١٩ ويربط الباحثون بين مستويات فيتامين (د)

وعاصفة السيتوكين جراء نشاط الجهاز المناعي الزائد للمصابين بـ كوفيد ١٩ والتي تلحق ضرراً بالغاً بالرئتين والموت. قد تبدو الدراسات في هذا الصدد غير كافية إلا أنه من المفيد أن نحافظ على نظام صحي يحتوي على فيتامين (د) والذي يتواجد في الأغذية الطبيعية مثل: اللحوم والبيض والفطر والأسماك كالسلمون والسردين والماكريل، إضافة إلى منتجات الألبان المدعومة بفيتامين (د) فضلاً عن أهمية التعرض لضوء الشمس باعتدال حيث تصنع أجسامنا معظم فيتامين (د) من أشعة الشمس المباشرة على الجلد (٣).

بحسب دراسة سعودية مشتركة مع جامعة بوسطن الأمريكية، فإن انتاج فيتامين (د) من الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فصل الصيف يبدأ تدريجياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ويصل لذروته عند الساعة ١١:٣٠، ويستمر إلى الثالثة ظهراً وأن الفترة ما بين ٩:٣٠ إلى ١١ صباحاً هي أفضل الأوقات ولا ينصح بالتعرض للشمس ما بين ١٢ إلى ٣ ظهراً، لأن التعرض في هذا الوقت يكون ضاراً نسبياً لشدة الحرارة واحتمالية إحداث تغيرات في كروموسومات خلايا الجلد مسببة السرطان (٣).

يتم تشخيص الإصابة بالمرض عبرأخذ مسحة الحلق أو مسحة البلعوم الأنفي وإجراء تقنية الاستنساخ العكسي - تفاعل البلمرة المتسلسل .(4)(RT-PCR)

وتعد تقنية الاستنساخ العكسي - التفاعل البوليميرى المتسلسل أو- RT- PCR إحدى أدق الأساليب المخبرية المستمدة من المجال النووي للكشف عن الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد.

وتعتمد فكرة هذه التقنية على عملية مضاعفة المادة الوراثية وتحديداً حمض (الدناDNA) وهي المادة الوحيدة القابلة للمضاعفة حيث يتم فك شريطي الدنا بعضهما عن بعض، ثم تكوين شريط جديد أمام كل شريط قديم باستخدام إنزيم البلمرة، ثم يرتبطان ليصبح لدينا جزيئان من الحمض بدلاً من جزء واحد، ويتكرر هذا الإجراء عدة مرات مما يؤدي في النهاية إلى تضخيم وإكثار الجزء المطلوب دراسته من المادة الوراثية حمض (الدنا) مئات الآلاف من المرات. ويمكن عبر الأشعة المقطعية رصد علامات الالتهاب الرئوي (5).

1.Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER).Vitamin C. Available at <https://www.mayoclinic.org/ar/drugs-supplements-vitamin-c/art-20363932>.

- 2.Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). Zinc. Available at <https://www.mayoclinic.org/ar/drugs-supplements-zinc/art-20366112>.
- 3.Ministry of Health - Bahrain.3-Your health matters to us .. and what is the truth and myth about Vitamin D?.Available at <https://www.moh.gov.bh/Blog/Article/Details/43> .
- 4.Ahmad S, Hafeez A, Siddqui SA, Ahmad M, Mishra S. A Review of COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) Diagnosis, Treatments and Prevention. EJMO 2020;4(2):116–125.
- 5.Velavan TP, Meyer CG. The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health. 2020;25(3):278–280.
doi:10.1111/tmi.13383 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052514./](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052514/)

الخيارات الدوائية قيد التجرب

1-ريمديسيفير (Remdesivir)

وقد طورته شركة جلعاد إثر تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة من 2014 وحتى 2016. والريمديسيفير من مضادات الفيروسات نظرية النوكليوتيدات مما يعرقل قدرة الفيروس ذي المحتوى من الرنا على الاستنساخ والتكاثر ويستخدم عن طريق الحقن بالوريد. كما وجد أن العلاج المبكر بالريمديسيفير يقلل من تكاثر الفيروس ومن الآثار السلبية على الرئة (1). ويعمل الدواء في صورته النشطة ثلاثة الفوسفات وبشكل انتقائي تجاه البوليمرات الفيروسية بما يعني سمية أقل تجاه الإنسان. ويتمتع بطول فترة نصف عمر داخل الخلايا مما يجعله يستخدم مرة واحدة يومياً وتبلغ الجرعة 200 mg وريدياً في اليوم الأول تليها جرعة وريدية يومية 100 mg في مدة حقن من 30-60 دقيقة لمدة عشرة أيام (2,3,4). وقد أثبتت الجرعات اليومية الواحدة من هذا العقار فاعليتها لدى القرود الرايزيسية المصابة بـ كوفيد - 19 حيث أدت الجرعات مرة واحدة يومياً إلى وقف التكاثر الفيروسي (4).

كما تشير بيانات معاهد الصحة الوطنية الأمريكية إلى فاعلية الريمديسيفير في إنقاص زمن التعافي من خمسة عشر يوماً حتى أحد عشر يوماً لدى مصابي كوفيد - 19.

وافقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام الريمديسيفير لمرضى كوفيد-19 في حالات الطوارئ وهي الحالات التي يعاني فيها المرضى من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، أو بحاجة لجهاز التنفس الصناعي.

وقد فشل العلاج في السابق مع فيروس إيبولا إلا أنه أثبت فاعلية ضد سارس وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. ومن الأعراض الجانبية له: زيادة مستويات إنزيمات الكبد وانخفاض ضغط الدم والغثيان والقيء والتعرق والرعشة وقلة مستوى البوتاسيوم والألبومين وقلة عدد كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية.

- 1.Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. *Nature communications*. 2020;11(1):222.
- 2.Sheahan TP, Sims AC, Graham RL, et al. Broad-spectrum antiviral GS-5734 inhibits both epidemic and zoonotic coronaviruses. *Science translational medicine*. 2017;9.(396)

- 3.Siegel D, Hui HC, Doerffler E, et al. Discovery and Synthesis of a Phosphoramidate Prodrug of a Pyrrolo[2,1-f][triazin-4-amino] Adenine C-Nucleoside (GS-5734) for the Treatment of Ebola and Emerging Viruses. Journal of medicinal chemistry. 2017;60(5):1648-1661.
- 4.Warren TK, Jordan R, Lo MK, et al. Therapeutic efficacy of the small molecule GS-5734 against Ebola virus in rhesus monkeys. Nature. 2016;531(7594):381-385

.....

٢-الكلوروكيٌن والهيدروكسي كلوروكيٌن

(chloroquine and hydroxychloroquine)

أظهرت التجارب الصينية للكلوروكيٌن بجرعة 500 ملجم عن طريق الفم مرتين يومياً فاعلية في تثبيط الالتهاب الرئوي وتحسين نتائج تصوير الرئة وسرعة التحول السلبي للفيروس (١). لكن الأعراض السمية للكلوروكيٌن شجعت على استخدام الهيدروكسي كلوروكيٌن. وقد أفادت بعض الدراسات إلى تأثير هيدروكسي كلوروكيٌن 200 ملجم عن طريق الفم كل 8 ساعات في استئصال الفيروس (١).

كانت البداية لاستخدام هذا العقار عام 1955 للوقاية والعلاج من مرض البرداء أو الملاريا وفي أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي طويل المدى. الآلية التي يعمل بها الاهيدروكسي كلوروكين ليست معلومة بالشكل الكامل، ولكن نظرياً يتطلب دخول الفيروسات المغلفة في الخلايا اندماج الغشاء المحيط بالفيروس مع غشاء الخلية المصابة للسماح بإطلاق الجينوم الفيروسي في السيتوبلازم. وفي حالة COVID-19 فالفيروس يرتبط بمستقبلات للإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) على سطح الخلايا، ثم يدخل الخلية مكملاً رحلته المرضية، حيث يستغل الخلية لتكون مصنعاً لاستنساخ ومضاعفة محتواه من الرنا الفيروسي. خطوة اندماج الأغشية الفيروسية والخلوية تحتاج إلى خفض الأُس الاهيدروجيني الحمضي في فجوة الليوسوم للخلية ومهمة الاهيدروكسي كلوروكين هي رفع الأُس الاهيدروجيني، وبالتالي يمنع الاندماج ودخول الفيروس للخلية. كما يثبط من إنتاج وتحرر السيتوكينات الضارة بالخلايا(2).

علاوة على ذلك، فقد أثبتت بعض الدراسات أن إضافة المضاد الحيوي أزيثروميسين (azithromycin) إلى الاهيدروكسي كلوروكين، يحسن كفاءة القضاء على السارس CoV-2 بشكل كبير (1).

ومن الأعراض الجانبية له صعوبات الرؤية والقراءة واعتلال شبکية العين المرتبط بالجرعة حتى بعد التوقف عن استخدامه، لذلك ينبغي فحص العينين بشكل دوري مع استخدامه، وكذلك تغير تصبغ العين وفرط تصبغ الجلد والطفح الجلدي والدوار وفقر الدم وحب الشباب والکواپيس والاكتئاب، إضافة إلى عدم الانتظام في ضربات القلب كما يقلل مؤقتاً من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى، كما قد يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم عند تناوله مع بعض الأدوية، كما يزيد من سوء حالة كل من الصدفية والبرفيريا.

وقد أوقفت منظمة الصحة العالمية مؤخراً التجارب السريرية الخاصة باستخدام دواء الملاريا الميدركسي كلوروکین مؤقتاً، وذلك لتقييم مدى سلامته استخدامه، حيث أثبتت بعض الدراسات ارتفاع معدل الوفيات لدى المجموعات التي تلقت العلاج بالميدركسي كلوروکین بنسبة 18% بالمقارنة بالمجموعة التي لم تعالج باستخدامه 9% فضلاً عن دراسات أخرى تشکك في جدواه لعلاج حالات فيروس كورونا (3).

1.Gautret P., Lagier J.C., Parola P.

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. Int. J. Antimicrob. Agents. 2020 doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.

- 2.Touret F, de Lamballerie X. Of chloroquine and COVID-19. Antiviral research. 2020;177:104762.
- 3.Magagnoli J., Narendran S., Pereira F. medRxiv; 2020. Outcomes of Hydroxychloroquine Usage in United States Veterans Hospitalized With Covid-19. 2020.04.16.20065920

....

3-فافيبيرافير (Favipiravir)

كانت المحطة الأولى لتجربة هذا العقار الياباني المضاد للفيروسات (فافيبيرافير favipiravir) المعروف تجارياً بـ(أفيجان Avigan) على كوفيد-19 في الصين، ووافقت على استخدامه في التجارب السريرية، حيث أحدث نجاحاً في تحول نتائج مرضي كوفيد - 19 من إيجابي لسلبي في غضون أربعة أيام، وبحسب الدراسة التي أجريت عليه في ووهان الصينية ونشرت بمجلة medrxiv العلمية، فقد تضمنت نجاح العقار الياباني في تخفيف أعراض مرضي كورونا في فترة وجيزه: الحمى في 2.5 يوماً، والسعال في غضون 4.6 يوماً (1).

يعمل (فافيبيرافير Favipiravir) بشكل انتقائي على منع إنزيم بلمرة الرنا الفيروسي (viral RNA dependent RNA polymerase) دون المساس بالخلايا البشرية.. وينذهب البعض إلى قدرة الفافيبيرافير المفسفر

(favipiravir-RTP) — وهي صورته النشطة — على إحداث طفرة عن طريق اندماجه بالخطأ باعتباره نيكلوتيد في الشريط المنسوخ من المحتوى الفيروسي مما يمنع دمج النيوكليوتيدات وبالتالي تعطل تضاعف الرنا الفيروسي (2).

أما فيما يخص الآثار الجانبية فلا توجد معلومات كثيرة في هذا الصدد بحكم حداهه الدواء، ولكن يحظر استخدامه تماماً أثناء الحمل لإحداثه تشوهات على الأجنة بحسب بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات كما أنه قد يسبب أعراضًا طفيفة، مثل: ارتفاع حمض الاليوريك في الدم، والإسهال، وارتفاع إنزيمات الكبد.

وقد استخدم هذا العقار في غرب أفريقيا لمكافحة فيروس إيبولا، لكن فاعليته لم تكن على القدر المنشود ففي تجربة سريرية للتحقق من فاعليته ضد مرض فيروس إيبولا في غويكيدو، غينيا، خلال ديسمبر 2014 أظهرت النتائج الأولية انخفاضاً في معدل الوفيات في المرضى الذين يعانون من مستويات منخفضة إلى معتدلة من فيروس إيبولا في الدم، ولكن خلا الدواء من التأثير على المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من الفيروس وهم الأكثرون عرضة لخطر الوفاة (2).

كما أبدي (فافيبيرافير) فاعلية محدودة ضد فيروس زيكا في الدراسات على الحيوانات (2).

4- لوبينافير /ريتونافير (**Lopinavir and Ritonavir**)
وهو من مثبطات إنزيم البروتياز في فيروس الإيدز. وقد تم تجربته فيما يتعلق بحالات كوفيد- 19 لكن مؤخراً توصل باحثون في جامعة أكسفورد إلى نتائج تستبعد آلية فائدة ذات مغزى لعقار لوبينافير وريتونافير في مرضي كوفيد 19. ذلك أن العقار لم يفلح في خفض معدل الوفيات، أو مدة الإقامة في المستشفى، أو خطر التعرض لجهاز التنفس الصناعي مما دعا منظمة الصحة العالمية لإيقاف التجارب بشأنه لعدم الفاعلية (3).

- 1.Li G, De Clercq E. Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). *Nature Reviews Drug Discovery* 2020 Feb doi:10.1038/d41573-020-00016-0
- 2.Furuta Y, Gowen BB, Takahashi K, Shiraki K, Smee DF, Barnard DL (November 2013). "Favipiravir (T-705), a novel viral RNA polymerase inhibitor". *Antiviral Research*. 100 (2): 446–54.
doi:10.1016/j.antiviral.2013.09.015. PMC 3880838.
PMID 24084488.
- 3.WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) July 2020. Available at <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>

.....

5-نيتازوكسانيد (Nitazoxanide)

وهو من مضادات الطفيليات والإسهال. يمتلك نيتازوكسانيد فاعلية واسعة ضد الفيروسات في المختبر وتعود هذه الفاعلية لتدخله مع المسارات المنظمة لعملية التكاثر الفيروسي بالعائل (1). فضلاً عن كونه يزيد من إنتاج انترفيرون ألفا وبيتا، والتي تمنع تكاثر الفيروسات داخل الخلايا، ومن ثم يقلل انتشار العدوى الفيروسي بين الخلايا. لذلك تجري الدراسات عليه لدراسة فاعليته في الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة وذلك بجرعة 600 mg مرتين يومياً عن طريق الفم، مما أدى لتحسين الأعراض في يوم واحد بالمقارنة بالدواء الوهمي البلاسيبو (2). لكن على الرغم من النشاط المختبري البشر لنيتازوكسانيد ضد SARS-CoV-2 إلا أنه فشل في تقليل مدة البقاء بالمستشفى وكذلك في تقليل مدة الأعراض في المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمرضى التهابات الجهاز التنفسي الحادة التي تسببها الفيروسات والتي تتطلب دخول المستشفى لتلقي العلاج (2).

....

6-توصيليزوماب (Tocilizumab)

توصيليزوماب: هو من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (المونوكلوinal antibody) المنتجة في المختبر ويتميز محلول المضاد

الوحيد النسيلة بكونه يعمل ضد مستضد معين (**الأنتител** antigen) ويمكن إنتاجه بكميات كبيرة على عكس الأجسام المضادة الطبيعية في الدم والتي تشكل خليطاً من عدة أجسام مضادة تتفاعل مع كثير من المستضدات. ويستخدم لثبيط مستقبلات أنتروجين-6 والتي تفرزها **macrophages and monocytes** ضمن الاستجادات المناعية والأعراض المصاحبة لعاصفة السيتوكين، السبب في معدلات الوفاة بكوفيد -19(3). وقد أحرز التوسيليزوماب نجاحاً في علاج الحالات المستعصية في كل من الصين وإيطاليا.

والجرعة الموصى بها في الحالات الحرجة والشديدة من COVID-19 هي 4-8 ملجم لكل كجم أو 400 ملجم قياسي كجرعة وريدية واحدة مع خيار تكرار الجرعة خلال 12 ساعة بحيث لا تتجاوز الجرعة الإجمالية 800 ملجم(4).

.....

7-الديكساميثازون:

توصلت دراسة بريطانية مؤخراً إلى أن عقار الديكساميثازون ذاتع الصيت قد قلل من معدلات الوفيات بين الحالات الحادة من مرضي كوفيد المحتاجين للعلاج بالأكسجين بدرجة كبيرة. والديكساميثازون هو أحد

الستيرويدات القشرية ويستخدم كمضاد للالتهاب عبر تثبيط حركة أحد الخلايا المناعية المعروفة بكريات الدم البيضاء متعددة النواة، كما يعمل على تثبيط عمل البروستاغلاندين والسيتوكين الالتهابية وهي المسئولة عن عاصفة السيتوكين المسببة لفشل التنفس مما يعني بارقةأمل لمرضى كوفيد الذين هم على أجهزة التنفس الصناعي (5,6). ونظراً للأعراض الجانبية لاستخدام مستحضرات الكورتيزون ومنها الديكساميثازون، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من تخزينه ومن الاستخدام العشوائي والخطائ له وأن استعماله يجب أن يكون وفق دواع طبية وتحت إشراف طبي ومن الآثار الجانبية لدیکسامیثازون: تثبيط المناعة، والتعرض للإصابة بالأمراض المعدية، وتشوش الرؤية، وتورم الوجه والأطراف، وزيادة سريعة بالوزن، وبطء التئام الجروح، وارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم وسرعة أو بطء نبضات القلب (6).

- 1.Rossignol JF. Nitazoxanide, a new drug candidate for the treatment of Middle East respiratory syndrome coronavirus. Journal of infection and public health. 2016;9(3):227-230.
- 2.Haffizulla J, Hartman A, Hoppers M, et al. Effect of nitazoxanide in adults and adolescents with acute uncomplicated influenza: a double-blind, randomised,

placebo-controlled, phase 2b/3 trial. *The Lancet Infectious diseases.* 2014;14(7):609-618

3.Zhou F ea. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet.* Published online 9 Mar 2020.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30566-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3).

4.National Health Commission (NHC) of the People's Republic of China. The diagnosis and treatment guide of COVID-19 pneumonia caused by new coronavirus infection 7th Edition, published March 3rd, 2020. Translated to English.

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/04/content_5486705.htm

5.Ahmad S, Hafeez A, Siddqui SA, Ahmad M, Mishra S. A Review of COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) Diagnosis, Treatments and Prevention. *EJMO* 2020;4(2):116–125.

6.NIH. COVID-19 Treatment guidelines. Available at. <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/corticosteroids/> Last Updated: July 17, 2020.

References:

- Ahmad S, Hafeez A, Siddqui SA, Ahmad M, Mishra S. A Review of COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) Diagnosis, Treatments and Prevention. EJMO 2020;4(2):116–125.
- Center for disease control and prevention, coronavirus disease 2019 (COVID-19).
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.
- Furuta Y, Gowen BB, Takahashi K, Shiraki K, Smee DF, Barnard DL (November 2013). "Favipiravir (T-705), a novel viral RNA polymerase inhibitor". Antiviral Research. 100 (2): 446–54.
doi:10.1016/j.antiviral.2013.09.015. PMC 3880838. PMID 24084488.
- Gautret P., Lagier J.C., Parola P. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. Int. J. Antimicrob. Agents. 2020 doi:
10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.
- Haffizulla J, Hartman A, Hoppers M, et al. Effect of nitazoxanide in adults and adolescents with acute uncomplicated influenza: a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2b/3 trial. The Lancet Infectious diseases. 2014;14(7):609-618.
- Li G, De Clercq E. Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Nature Reviews Drug Discovery 2020 Feb doi:10.1038/d41573-020-00016-0.

Magagnoli J., Narendran S., Pereira F. medRxiv; 2020. Outcomes of Hydroxychloroquine Usage in United States Veterans Hospitalized With Covid-19. 2020.04.16.20065920.

-Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). Vitamin C. Available at <https://www.mayoclinic.org/ar/drugs-supplements-vitamin-c/art-20363932>.

-Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). Zinc. Available at <https://www.mayoclinic.org/ar/drugs-supplements-zinc/art-20366112>.

-Ministry of Health - Bahrain. Your health matters to us .. and what is the truth and myth about Vitamin D?. Available at

<https://www.moh.gov.bh/Blog/Article/Details/43>.

-National Health Commission (NHC) of the People's Republic of China. The diagnosis and treatment guide of COVID-19 pneumonia caused by new coronavirus infection 7th Edition, published March 3rd, 2020. Translated to English.

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/04/content_5486705.htm.

-NIH. COVID-19 Treatment guidelines. Available at. <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/corticosteroids/> Last Updated: July 17, 2020.

- Rossignol JF. Nitazoxanide, a new drug candidate for the treatment of Middle East respiratory syndrome coronavirus. *Journal of infection and public health.* 2016;9(3):227-230.
- Sheahan TP, Sims AC, Leist SR, et al. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV. *Nature communications.* 2020;11(1):222.
- Sheahan TP, Sims AC, Graham RL, et al. Broad-spectrum antiviral GS-5734 inhibits both epidemic and zoonotic coronaviruses. *Science translational medicine.* 2017;9.(396)
- Siegel D, Hui HC, Doerffler E, et al. Discovery and Synthesis of a Phosphoramidate Prodrug of a Pyrrolo[2,1-f][triazin-4-amino] Adenine C-Nucleoside (GS-5734) for the Treatment of Ebola and Emerging Viruses. *Journal of medicinal chemistry.* 2017;60(5):1648-1661.
- Singhal, T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). *Indian J Pediatr* (2020).
<https://doi.org/10.1007/s12098-020-03263-6>.
- Touret F, de Lamballerie X. Of chloroquine and COVID-19. *Antiviral research.* 2020;177:104762.
- Velavan TP, Meyer CG. The COVID-19 epidemic. *Trop Med Int Health.* 2020;25(3):278–280.
doi:10.1111/tmi.13383 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052514./](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052514/)

- Warren TK, Jordan R, Lo MK, et al. Therapeutic efficacy of the small molecule GS-5734 against Ebola virus in rhesus monkeys. *Nature*. 2016;531(7594):381-385.
- WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) July 2020, <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>.
- Zhou F ea. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet*. Published online 9 Mar 2020.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30566-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3).

الدراسة الثانية

إدارة أزمة مجتمع الكورونا

سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، صحياً

الملخص:

في خضم جائحة عالمية واسعة النطاق وشديد الوطأة مثلها فيروس كورونا المستجد أفضت إلى معاناة البشرية جماء على نحو غير مسبوق في التاريخ المعاصر ودفعت برفاهاية الدول المتقدمة إلى حافة الانهيار. وأن فيروس كورونا لا يعرف حدوداً. فقد أثر بالسلب على حياة جميع الناس المعيشية دون استثناء على اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية. تلك الحالة الطارئة استلزمت في المقابل استجابة إقليمية ودولية طارئة؛ فحشدت دول العالم كافة مواردها لمواجهة العواقب الوخيمة لجائحة كوفيد - 19 على الصعيدين الصحي والاقتصادي و مختلف مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى عبر اتخاذ تدابير وقائية وعلاجية وتوعوية سريعة وحاسمة للحد من انتشار المرض وحماية شعوبها، خاصة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، وقد شهدت الخدمات الصحية المقدمة على المستوى الدولي تفاوتاً تبعاً

لدرجة تحضر الدول ورقيها مما يتطلب معه جهوداً منسقة ومشتركة بين
الدول في حالات الطوارئ الإنسانية.
الكلمات المفتاحية: فيروس - كوفيد - وقائية - العدوى

.....

بحث نشر بالكتاب المحكم: مجتمع الكورونا إلى أين؟ التداعيات والرهانات
مخبر البحوث والدراسات الاجتماعية جامعة 20 1955 أوت سكيكدة
بالجزائر.

Abstract

In the midst of a large-scale and severe global pandemic like the emerging Corona virus, it has led to the suffering of all humankind in an unprecedented way in contemporary history and pushed the well-being of developed countries to the brink of collapse, and because the Corona virus knows no boundaries. It has negatively affected the livelihood of all people without exception, regardless of their social and economic backgrounds. This emergency situation necessitated, on the other hand, an emergency regional and international response, so the countries of the world mobilized all their resources to confront the dire consequences of the Covid-19 pandemic on the health and economic levels and in various other areas of social life by taking rapid and decisive preventive, curative and awareness measures to limit the spread of the disease and protect its people, especially the elderly and those with diseases. The health services provided at the international level have witnessed our disparity according to the degree of civilization and sophistication of countries, which requires concerted and joint efforts between countries in humanitarian emergencies.

Key words: Virus - Covid - Preventive - Infection

مقدمة

فيروس لا يرى بالعين المجردة وعلى الرغم من صغر حجمه استطاع أن يفرض كلمته على العالم أجمع وأن ينشر الهلع والخوف مع سرعة انتشاره الكبيرة عبر قارات العالم، حاصداً الأرواح إنه فيروس كوفيد 19 المستجد والذي ظهر لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019، ومنذ هذا الوقت وهو حديث العالم. لقد تسبب هذا الفيروس في تدهور الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق، كما غير من الشكل الاجتماعي في العالم أجمع وحتى هذه اللحظة لم يتم التوصل للقاح لکبح جماحه، مما جعل العالم يتعايش معه في إجراءات وخطط مستمرة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لمنع تفشييه والتقليل من آثاره.

على الصعيد السياسي:

تبينت الطرق والوسائل التي انتهجتها السلطات الحاكمة في الدول المختلفة تبعاً لنوعية هذه الأنظمة والتي تتنوع بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية، فكان أكثرها سوءاً الأنظمة الاستبدادية، وذلك فيما يتعلق بالتدفق المعلوماتي الجيد داخلياً وخارجياً، إلا أن بعضها أظهر تعاملًا قوياً

وفعالاً، ففي الصين وروسيا على الرغم من محدودية التدفق المعلوماتي داخلياً وخارجياً وهو ما أدى إلى منع معلومات مهمة تتعلق بحجم الجائحة، قد كان يمكنها منع تفشي المرض بدول الجوار على هذا النحو المروع⁽¹⁾.

Scott L.Greer,Elizabeth J.King,Elize Massard da Fonseca&Andre Peralta-(1)¹
Santos (2020). The comparative politics of COVID-19:The need to
understand government responses,Global Public Health,15:19,1413-
.1416,DOI:10.1080/17441692.2020.1783340

ل لكن الصين فقط هي التي اتخذت ونفذت إجراءات فعالة حقاً. في المقابل تواجه الأنظمة الديمقراطية صعوبة أكبر في اتخاذ إجراءات قوية أو حتى مناسبة، ولكن يمكنها الاستفادة من تدفق المعلومات بشكل أفضل وتحظى بشقة الجماهير داخل بلدانها وحول العالم لشفافية المعلومات لديها⁽¹⁾.

في بعض البلدان تنصلت السلطة المركزية من مسؤولياتها، وأجبرت الحكومات المحلية على توقيع أدوار قيادية نيابة عنها فعل سبيل المثال، في البرازيل، يبدو أن خلافات حكام الولايات مع الرئيس بولسونارو حول التباعد الاجتماعي قد وحدت الناخبين حول الحكام مما جعلهم أكثر شعبية منه ذلك أن سوء إدارة بولسونارو للأزمة أضر بشعبيته، حيث الافتقار إلى التسلسل الهرمي والتنسيق المحكم إضافة إلى استخفاف بولسونارو بإجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الصحي وتقييد الأنشطة التجارية والخدمية في بلاده وهو ما أدى إلى مزيد من الفرص الضائعة لإنقاذ الأرواح في بلاده⁽²⁾.

Shih, V.C.(Ed.).(2020).Economic shocks and authoritarian stability: (1) ¹.Duration, financial control, and institutions. University of Michigan Press
Phillips, T. (2020).The Guardian (2) ²
<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/brazils-jair-bolsonaro-says-coronaviruscrisis-is-a-media-trick>

أما في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغ فيها معدل الإصابة والوفيات الأعلى في العالم، فإن الرئيس الأمريكي رونالد ترامب يواجه انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في موسم الانتخابات الحالي لعدم تقديره للأزمة على النحو الصحيح، ففي تجمع انتخابي في يونيو 2020 أبلغ ترامب ناخبيه أنه مع إبطاء عملية إجراء الفحوص ومع تصاعد الرأي العام ضد هذا الإجراء عاد عن تصريحه واصفاً إياه بنوع من السخرية.

إصرار الرئيس ترامب على توجيه متابعيه باستعمال الهيدروكسي كلوروكين وأنه يتبعاه كجرعة وقائية على الرغم من مناشدة الم هيئات الصحية بأمريكا وخارجها للترى حتى الانتهاء من الدراسات، ثم ثبّوت أنّ العقار في النهاية لا يوجد دليل على فاعليته ضد فيروس كوفيد المستجد⁽¹⁾. فضلاً عن التأثيرات الجانبية لهذا العقار على القلب كل هذا ضاعف من الانتقادات ضد ترامب.

أما في السويد والتي اختارت أن تخالف العالم وتنتهج خطة مناعة القطيع بدلاً من التباعد الاجتماعي، فقد دفع المسنون ثمن هذه السياسة مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بشكل عام وخاصة في صفوفهم وقد أظهرت دراسة

Magagnoli J., Narendran S., Pereira F. medRxiv(2020). Outcomes of (1)¹ Hydroxychloroquine Usage in United States Veterans Hospitalized With Covid-19. 2020.04.16.20065920

الحديثة أن 15٪ فقط من سكان السويد قد تمكنا من تطوير أجسام مضادة لفيروس كوفيد 19 المستجد مما يعني إخفاق خطة مناعة القطيع من أوجه عديدة⁽¹⁾.

أما القارة الأفريقية والتي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والنقص في الخدمات الصحية وعدم دقة التدفق المعلوماتي منها فقد كشف إعلان رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، عن شاي عشبي من الشيح وهو يرتشف منه ليكون من أوائل مجريبه يعطي نتائج إيجابية في 7 أيام وقد نجح في علاج شخصين وهو ما يوضح فقر بعض حكام دول القارة في تقدير حجم الكارثة ومواجهتها.

في النهاية فإن قدرة الدولة على إدارة الأزمات وتقديم الخدمات وإنفاذ الخطط بسرعة ودقة، والاستثمار في ذلك هو أمر غاية في الأهمية بما في ذلك التحكم في أنظمة الرعاية الصحية والإدارة العامة لضمان سرعة الاستجابة وإدارة الأزمات بفاعلية⁽²⁾.

Orlowski EJW., Goldsmith DJA.(2020).Four Months into the COVID-19¹ Pandemic,Sweden,s Prized Herd Immunity Is Nowhere in Sight.J.R.Soc.Med.2020,113(8),292-298.DOI:10.1177/0141076820945282
Scott L.Greer,Elizabeth J.King,Elize Massard da Fonseca&Andre Peralta-² Santos (2020) The comparative politics of COVID-19:The need to understand government responses,Global Public Health,15:19,1413-1416,DOI:10.1080/17441692.2020.1783340

لقد أثبتت الحاجة وبحلأه أن امتلاك الدول القوية للقدرة لا يعني أنه سيتمكن استخدامها بشكل جيد، فلقد رأينا دولاً متوسطة ومنخفضة الدخل مثل منغوليا والجبل الأسود وفيتنام تنفذ خططاً صحية واستجابات عامة أكثر فعالية لمواجهة COVID - 19 - من بعض الدول ذات الدخل المرتفع⁽¹⁾.

على الصعيد الاقتصادي:

إنجائحة كوفيد- 19 تتعذر كونها أزمة صحية عابرة، فهي كارثة إنسانية بكل المقاييس تلقي بظلالها على كافة مناجي الحياة، لقد هاجمت قلب المجتمعات واقتصادياتها على تباينها وأدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي الاعتيادي والحياة اليومية العامة لbillions البشر حول العالم. وفي إطار مواجهة هذه الجائحة، اتخذت العديد من حكومات العالم إجراءات وخططًّا صارمة لمنع تفشي المرض في ربوعها، وللتأكد من الأداء الفعال لنظام الرعاية الصحية المتكاملة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا كالمسنين والأطفال من الأخطار المحدقة. ولكن مع تزايد حالة الخوف العام وفرض قيود صارمة على الأعمال التجارية، وتعطيل حركة السفر داخل القطر الواحد وخارجيه أدى كل هذا إلى انخفاض الإنتاج والاستثمارات والأرباح بشكل

Scott L.Greer,Elizabeth J.King,Elize Massard da Fonseca&Andre Peralta-(1) ¹
Santos (2020) The comparative politics of COVID-19:The need to understand
government responses,Global Public Health,15:19,1413-
.1416.DOI:10.1080/17441692.2020.1783340

كبير مما أدى إلى إفلاس منشآت عدة وتسريح العمالة لديها مما انعكس على ارتفاع معدل البطالة حول العالم⁽¹⁾.

عادة ما يكون للوباء أثران رئيسيان على الاقتصاديات: الأول يتعلق بتوريد السلع والخدمات بسبب اضطرابات سلسلة القيمة على المستويين الإقليمي والدولي، والثاني يتعلق بالطلب على السلع والخدمات بسبب فقدان الدخل مما ينعكس بالسلب على الشركات والتي تعاني خطر خسائر العائدات وبالتالي انخفاض القدرة الإنتاجية والعجز عن السداد، وفي النهاية يكون تعليق أو تخفيض الأنشطة التجارية والصناعية والاستغناء عن جزء أو غالبية العمال بها لتقليل الإنفاق في هذه الظروف التي تتسم بعدم اليقين. وإضافة لذلك، يؤدي الطلب على السيولة وارتفاع معدلات تفادي المخاطر في حدوث ضغوط جمة في الأسواق المالية وما يصاحب ذلك من تأثيرات كبيرة في تحديد أسعار الأصول وتمويل الديون⁽²⁾.

ولنأخذ بعض الأمثلة من محيطنا العربي فمثلاً يعتمد اقتصاد الدول العربية الخليجية كالسعودية والإمارات على إيرادات النفط والسياحة والبناء ومع تفشي فيروس كوفيد 19 تضررت هذه الاقتصاديات مع توقف السياحة بشكل شبه كامل والقيود على حركة التجارة العالمية، وقد أدت الجائحة إلى

SESRIC (2020):Socio-economic impacts of covid -19 pandemic in oic ¹.member countries. Accessed at <https://sesric.org/files/articles/724pdf>

SESRIC (2020):Socio-economic impacts of covid -19 pandemic in oic ².member countries. Accessed at <https://sesric.org/files/articles/724pdf>

استمرار تريف الانخفاض في أسعار النفط بشكل غير مسبوق نظراً لانخفاض الطلب مع كثرة المعروض، مما أدى إلى خسارة المنطقة العربية إيرادات نفطية قيمتها الصافية ما يقارب من 11 مليار دولار تقريباً، سجلت الشركات في المنطقة العربية خسائر هائلة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وتعادل الخسائر في ثروة هذه الشركات نسبة 8 في المائة من إجمالي ثروة المنطقة⁽¹⁾. وقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 13% تقريباً⁽²⁾.

ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصاديات الناشئة والنامية مما يؤثر على الحياة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات والدول وفقاً لتوقعات الاقتصاد العالمي والمثال على ذلك مصر، فقد شهد برنامج الإصلاح الذي أطلق عام 2016 تقدماً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والذي تجاوز 5% كما ارتفعت إيرادات السياحة ولكن مع الإجراءات الدولية التي صاحبت جائحة كوفيد وتعليق الرحلات الجوية إضافة لتراجع إيرادات قناة السويس تبعاً للركود التجاري

ESCPWA(2020). Regional Emergency Response to Mitigate the Impact of COVID-19. Accessed at <https://www.unescwa.org/oes-speeches/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19>

OECD(2020). Covid-19 and International Trade: Issues and Actions. (2) Accessed on 11/8/2020, at :<https://bit.ly/2DMwTxM>

ال العالمي وتضاؤل تحويلات العاملين بالخارج إثر فقد أعمالهم علاوة على الإجراءات التي اتخذتها مصر من فرض حظر التجوال مساءً في أرجاء مصر مما زاد من احتمال تصاعد معدل الفقر، حيث تضطّع السياحة والتحويلات الأجنبية بدور واسع النطاق⁽¹⁾.

وبحسب التوقعات العالمية ستهدّي الجائحة ب 49 مليون شخص إلى مستوى الفقر المدقع⁽²⁾.

قدمت العديد من دول العالم حُرماً من المساعدات لدعم مواطنيها ولتعزيز قدرة القطاعات المتضررة لديها على التعافي ومعالجة التراجع الشديد في نشاط المشروعات الصغيرة نتيجةً للجائحة. فمثلاً أعلنت الإمارات عن خطٍّ تحفيز بقيمة 27 مليار دولار، تهدف إلى النهوض بالاقتصاد، وتتضمن دعم خدمات المياه والكهرباء المقدمة للمواطنين ومن أجل تشجيع النشاط التجاري والصناعي⁽³⁾.

IFPRI EGYPT (2020).ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 ON TOURISM AND (1)¹ REMITTANCES:INSIGHTS FROM EGYPT,12 april 2020. Accessed at :<https://egyptssp.ifpri.info/2020/04/12/economic-impact-of-covid-19-on-tourism-and-remittances-insights-from-egypt>

SESRIC (2020):Socio-economic impacts of covid -19 pandemic in oic (2)² .member countries. Accessed at <https://sesric.org/files/articles/724pdf>

ESCWA(2020). Regional Emergency Response to Mitigate the Impact of (3)³ COVID-19.Accessed at <https://www.unescwa.org/oes-speeches/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19>

كذلك، وضعت مصر خطة متكاملة تكلفتها ٦ مليارات دولار لدعم النمو الاقتصادي عبر إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف إمداد الكهرباء والغاز الطبيعي للشركات الصناعية والسياحية وتقديم منح للعمالة اليومية وهي الفئة الأكثر تضرراً في المجتمع المصري. وأعلنت قطر عن حزمة مساعدات بقيمة ٢٣ مليار دولار، تهدف لدعم الاقتصاد ومساندة القطاع الخاص ومؤازرته. وأعلنت السعودية عن حزمة تحفيز بقيمة ١٣ مليار دولار، ترمي من خلالها دعم وتمويل الشركات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة^(١:٢).

على الصعيد الاجتماعي:

على الرغم من أن مسألة إغلاق المدارس هي إجراء وقائي مؤقت يستهدف حماية الطلاب من تفشي المرض في أوساطهم إلا أن التداعيات التي يحملها هذا القرار قد تؤثر بالسلب على الأمد الطويل فقد ترتفع معدلات التسرب

Egypt Today. (2020). Egypt takes economic measures related to pensions, (1) agricultural taxes

<https://www.egypttoday.com/Article/3/82883Egypt-takes-economic-measures-related-to-pensions-agricultural-taxes>

ESCWA(2020). Regional Emergency Response to Mitigate the Impact of (2) COVID-19. Accessed at <https://www.unescwa.org/oes-speeches/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19>

التعليمي وقد يصبح هذا التسرب دائم لدى الفئات الفقيرة والمهمشة والتي لا تمتلك كلفة الخيارات البديلة كاستخدام التكنولوجيا والإنترنت. كما يعد الطلاب المنتسبين إلى فئات المهاجرين والأقليات العرقية واللاجئين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم الأكثر عرضة لتحمل أعباء هذه الجائحة ليس هذا مرجعه إلى كثرة أعداد هذه الفئات، بل لعدم توافر الخطط الوطنية للتعامل مع هذه الفئات وتلبية احتياجاتهم في حالات الطوارئ، إضافة إلى العجز الاقتصادي لدى بعض البلدان التي تتوارد بها هذه الفئات بما يعود عليهم بالضرر المباشر حيث تعاني مخيمات اللاجئين من نقص بالأدوية والتجهيزات ونقص في العاملين في المجال الصحي^(1,2).

الطلاب المنتسبون للمجتمعات المهمشة والمقيمين في المناطق العشوائية التي تعاني تدني الدخول وقلة الغذاء الذي يفي باحتياجات الأطفال الأساسية لبناء أجسامهم، حيث تشكل الوجبات اليومية لهم في المدارس علامة على المتابعة الصحية لهم كالتطعيمات وخلافه والدعم النفسي والمعنوي ضرورات تحفظ حياتهم وتقيمهم من الأمراض، لذا وفي هذه الحالات فالمدرسة ليست فقط مكاناً تعليمياً بل أيضاً سبيلاً للوقاية وتقديم الدعم

-
- Psacharopoulos, G., Patrinos, H., Collis, V., & Vegas, E. (2020, April 29). (1) The COVID-19 cost of school closures. Retrieved from: <https://brook.gs/2XhAoIS>
- Kluge, H. P., Jakab, Z., Bartovic, J., D'Anna, V, Severoni, S. (2020). Refuge (2) and migrant & health in the COVID-19 response. The Lancet, 1239-1237, (10232)395

وحائط صد لحفظ حياة الطلاب داخلها ويعكّد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "ديفيد بيزلي" على حتمية التحرك بشكل سريع وعاجل للhilولة دون "تحول هذه الجائحة الصحية إلى كارثة المجاعة" لأن هذه الوجبة المدرسية تمثل للملايين من الأطفال حول العالم السبيل الوحيد للغذاء طوال اليوم. وبدونها، يواجهون شبح الجوع وخطر المرض. وبحسب برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، حالات إغلاق المدارس والتي صاحبت الجائحة قد أدت إلى حرمان ما يربو على 370 مليون طفل من وجباتهم المدرسية، خاصة في القارة الأفريقية⁽¹⁾.

على جانب آخر قد تستغل حكومات بعض الدول النامية ذات الاقتصاديات المنخفضة والمتوسطة إغلاق المدارس في تحويل ميزانياتها الخاصة بالتعليم إلى قطاعات أكثر ضرورة كالصحة ولدعم القطاع الخاص والضمان الاجتماعي، في المقابل قد تشهد بعض الدول المتقدمة انكماساً اقتصادياً على أثر الأزمة مع انخفاض الناتج المحلي مما يؤدي إلى تقليل الميزانيات الوطنية وخفض الإنفاق على التعليم وتقليل الدعم المخصص له مما يؤدي

UNICEF. (2020). Future of 370 million children in jeopardy as school (1)¹ closures deprive them of school meals - UNICEF and WFP. 28 April 2020.
Retrieved from <https://uni.cf/3e8J0lz>

إلى خفض رواتب المعلمين، وتقليل أعدادهم ونقص تمويل الأبحاث وخطط التطوير⁽¹⁾.

تعتبر المرأة أكثر فئات المجتمع تضرراً وخسارة خاصة في المنطقة العربية جراء الحاجة، حيث تتعرض لمخاطر إضافية بحكم اعتماد القطاع الصحي عليها كممرضات وقابلات قانونيات وموظفات دعم، مما يجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد 19.

فضلاً على أن العزلة الاجتماعية التي فرضها الفيروس قد تزيد من معدلات العنف المنزلي ضد النساء، الذي تعاني منه في الأساس 37 في المائة من النساء العربيات دون رادع إضافة إلى ارتفاع معدلات الطلق. كما تواجه النساء والفتيات في مجتمعات اللاجئين والنازحين داخلياً وخارجياً مخاطر صحية مضاعفة، حيث يتعدّر عليهن الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين، مما يقلل من قدرتهن على مواجهة هذا الفيروس الواسع الانتشار⁽²⁾.

The Malala Fund. (2020). Girls' education and COVID-19: What past (2) ¹ shocks can teach us about mitigating the impact of pandemics. Accessed at <https://mala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19>

UN Women. (2020). Guidance note :Addressing the Impacts of the Covid- ² 19 Pandemic on Migrant Workers. Accessed at : <https://www.unwomen.org/en/digital>

لا شك أن الجائحة قد أثرت بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والسلوكية داخل المجتمعات، حيث تتضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة داخل أغلبية الدول: منع التزاور وإغلاق دور عبادة ومنع الطقوس الدينية التي تشهد ازدحاماً، علاوة على تغيير الديناميكيات الاجتماعية، مثل البقاء في المنزل وقضاء أغلب الوقت مع العائلة، وعدم السفر داخل القطر الواحد وخارجها، كما ازداد تفعيل الخدمات الإلكترونية وخدمات التوصيل عبر الإنترنت حتى يتتجنب الناس الذهاب إلى المناطق المزدحمة في أعقاب الجائحة. إضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ومن الضروري الانتباه إلى مخاطر ترك العنوان للأطفال والراهقين في استعمال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون رقيب ودون توجيه.

على الصعيد الصحي:

فيروس كوفيد-19 هو فيروس تنفسى جديد ظهر في مدينة ووهان الصينية لأول مرة وهو من زمرة الفيروسوالتاتاجية، وتتنوع أعراضه بين سيلان الأنف أو الاحتقان، والإسهال والغثيان، والسعال والحمى، والتهاب الحلق وضيق التنفس، والصداع وأوجاع الجسم والعضلات، وفقدان حاسبي الشم والتذوق، وهو يصيب كافة المراحل العمرية دون استثناء مع

تزايد المخاطر في الفئات الأكبر عمراً والمصابين بأمراض مزمنة، مثل: مرض السكري وضغط الدم، وتفيد التقديرات بأن فترة حضانة الفيروس خلال 14 يوماً بعد التعرض للفيروس⁽¹⁾.

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس عام 2020 على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس فيروس كوفيد 19 المستجد باعتباره جائحة أي وباء عالمياً، وقد حددت المنظمة أهدافاً استراتيجية للتعامل مع الفيروس المستجد من أهمها الحد من انتقال العدوى من شخص لآخر والتعرف المبكر على الحالات المصابة وعزلها، وتقديم العناية الكاملة لها والتعرف على خصائص الفيروس وتوجيه إشكال الدعم للأبحاث الحالية فيما يخص العلاجات واللقاحات⁽²⁾.

وبناءً على ذلك اتخذت الدول تدابير قوية لسرعة الكشف عن المرض وعزل وعلاج الحالات المصابة وتتبع المخالطين ونشر ثقافة غسيل الأيدي وأساليب مكافحة العدوى داخل كافة الأماكن ومنع التجمعات وانتهاج سياسة التباعد الاجتماعي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات مع فرض غرامات في حالة عدم الالتزام.

Center for disease control and prevention, corona-virus disease 2019 (1)¹ (COVID-19). <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>

WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) July 2020, (2)
<https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>

كما تعاملت المنظمة والمراکز والمؤسسات العلمية بحزم مع الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر إتاحة وتحديث المعلومات الخاصة بمستجدات الفيروس أول بأول على موقع المنظمة وعبر وسائل الإعلام، كما طرحت مؤسسات مثل جامعة هارفارد وستانفورد محاضرات تعليمية عن بعد تتيح للممارسين الصحيين والمهتمين التعرف على كل ما يحيط بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية التعامل معه وكيفية تقديم الدعم النفسي للمرضى والمواطنين.

وبحسب التقديرات الحالية حتى يوم حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2020، تجاوزت أرقام الحالات التي أعطت نتائج إيجابية لاختبارات فيروس كورونا «كوفيد-19» بعد عمل مسحة «بي سي آر»، حاجز الـ 44,323,520 حالة إصابة، وازدادت أعداد حالات الوفيات لتصل إلى 1,173,197 حالة وفاة، فيما شهدت حالات التعافي من فيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفاعاً أيضاً لتصل إلى 32,487,276 حالة تعافي وهو مؤشر يدعو للتفاؤل⁽¹⁾.

تتطلب حالات مرضي كوفيد - 19 الحرجية عدداً كافياً من أسرة العناية المركزية للتعامل السريع مع انتشار العدوى وإبقاء المرضى متصلين بالأأنابيب ومعرضين إلى تهوية جيدة للنجاة والشفاء، وتعاني الدول النامية

JHU CSSE COVID-19 Data. 28 october 2020. Retrieved from (1)¹ .<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>

منخفضة الدخل من قلة عدد الأسرّة بوحدات العناية المركزة. كما تعاني القارة الأفريقية تفاوتاً في المعدات الطبية الضرورية لهذه الحالات الحرجة فعلى سبيل المثال مالي لا تمتلك سوى 3 أجهزة للتنفس الصناعي، تليها بوركينا فاسو 11 وسيراليون 13 فيما تمتلك نيجيريا 169 والسودان 80 مما يستدعي تضافر التعاون بين هذه الدول وبين المجتمع الدولي⁽¹⁾.

في سياق متصل تباري المعاهد البحثية وشركات الأدوية حول العالم لسرعة التوصل إلى علاج فعال ولقاح للفيروس المستجد. ومن الأدوية التي أثارت جدلاً واسعاً الهيدروكسي كلوروكين دواء الملاريا الشهير، والذي أوقفت منظمة الصحة العالمية التجارب السريرية بشأنه بعد ظهور أبحاث تظهر عدم نجاعته ضد كوفيد-19⁽²⁾.

ومن الأدوية الأخرى عقار ريمديسيفير والذي لم يظهر فاعلية كبيرة إلا أنه يقلل متوسط فترة شفاء المريض من 15 إلى 11 يوماً. كما تشير الدراسات إلى فاعلية الديكساميثازون في الحالات الخطرة التي تحتاج

New York Times (2020). 10 African Countries Have No Ventilators. 18 April ¹
2020. Retrieved from <https://nyti.ms/2A088wh>
Magagnoli J., Narendran S., Pereira F. medRxiv(2020). Outcomes of ²
Hydroxychloroquine Usage in United States Veterans Hospitalized With
.Covid-19. 2020.04.16.20065920

جهاز التنفس الاصطناعي، حيث يؤدي إلى خفض معدل الوفيات في هذه الحالات⁽¹⁾.

أما فيما يخص اللقاحات فتعد المشاريع البحثية والتي تربو على المائة بعضها يعتمد على فيروس خامل وبعضها تستخدم ناقلاً فيروسيًا والبعض الآخر يعتمد على استخدام المواد الجينية المعدلة (الرنا). ولا زال العالم في انتظار هذا اللقاح الذي سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

التوصيات

- ١- توسيع مظلة الخدمات الاجتماعية لضمان استفادة الفئات المحرومة منها.**
- ٢- تعزيز مبادرات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات.**
- ٣- دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الكاملة لهم تعليمياً وصحياً.**
- ٤- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر والأزواج.**
- ٥- استمرار الاستثمار في التعليم والتوعية في الدراسة عن بُعد، وتفعيل كافة السبل التكنولوجية التعليمية وتحسين سرعات شبكات الإنترن特.**
- ٦- تشجيع الدفع غير النقدي عبر الوسائل الرقمية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية للخدمات الحكومية وتعاملات البنوك.**
- ٧- تقديم سبل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قروض منخفضة أو دون فائدة لها وللعاملين بها.**
- ٨- التوسع في برامج التكافل الاجتماعي والحماية الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة خاصة المعاقين وكبار السن.**

- ٩-** تزليل كافة العقبات فيما يخص الصادرات والواردات الطبية الزراعية بين الدول المختلفة.
- ١٠-** تحسين وضع السجناء في السجون ومراكز الاحتجاز، والتأكد من عدم ازدحامها وتوفير الرعاية الطبية لهم.
- ١١-** تشجيع الإنتاج الغذائي ودعم صغار المنتجين والحفاظ على سلسل الإمداد الغذائي والزراعي.
- ١٢-** إنشاء صناديق خاصة للطوارئ يكون تمويلها من القطاع الخاص ورجال الأعمال لدعم الإجراءات الحكومية في الحد من آثار تفشي الجائحة.

المراجع

Center for disease control and prevention, coronavirus disease 2019 (COVID-19).

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.

Egypt Today. (2020). Egypt takes economic measures related to pensions, agricultural taxes.

<https://www.egypttoday.com/Article/3/82883Egypt-takes-economic-measures-related-to- /pensions-agricultural-taxes>

ESCWA(2020). Regional Emergency Response to Mitigate the Impact of COVID-19. Accessed at <https://www.unescwa.org/oes-speeches/regional-emergency-response-mitigate-impact-covid-19>.

IFPRI EGYPT (2020).ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 ON TOURISM AND REMITTANCES:INSIGHTS FROM EGYPT,12 april 2020. Accessed at :<https://egyptssp.ifpri.info/2020/04/12/economic-impact-of-covid-19-on-tourism-and remittances-insights-from-egypt/>

JHU CSSE COVID-19 Data. 28 october 2020.

Retrieved from

<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>.

Kluge, H. P., Jakab, Z., Bartovic, J., D'Anna, V

Severoni, S. (2020). Refuge and migrant & health in the COVID-19 response. *The Lancet*, 1239-1237 , (10232)395.

Magagnoli J., Narendran S., Pereira F. medRxiv(2020). Outcomes of Hydroxychloroquine Usage in United States Veterans Hospitalized With Covid-19. 2020.04.16.20065920.

New York Times (2020). 10 African Countries Have No Ventilators. 18 April 2020. Retrieved from <https://nyti.ms/2A088wh>

NIH. COVID-19 Treatment guidelines. Available at.

<https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/corticosteroids/> Last Updated: July 17, 2020.

OECD(2020).Covid-19 and International Trade:Issues and Actions. Accessed on 11/8/2020,at :<https://bit.ly/2DMwTxM>.

Orlowski EJW., Goldsmith DJA.(2020).Four Months into the COVID-19 Pandemic,Sweden,s Prized Herd Immunity Is Nowhere in Sight.J.R.Soc.Med.2020,113(8),292-298.DOI:10.1177/0141076820945282.

Phillips, T. (2020).The Guardian
<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/brasil-jair-bolsonaro-says-coronaviruscrisis-is-a-media-trick>.

Psacharopoulos, G., Patrinos, H., Collis, V., & Vegas, E. (2020, April 29). The COVID-19 cost of school closures. Retrieved from: <https://brook.gs/2XhAoS>.

Scott L.Greer,Elizabeth J.King,Elize Massard da Fonseca&Andre Peralta-Santos (2020). The comparative politics of COVID-19:The need to understand government responses,Global Public Health,15:19,1413-1416,DOI:10.1080/17441692.2020.1783340.

SESRIC (2020):Socio-economic impacts of covid -19 pandemic in oic member countries. Accessed at <https://sesric.org/files/articles/724pdf>.

Shih, V.C.(Ed.)(2020).Economic shocks and authoritarian stability: Duration, financial control, and institutions. University of Michigan Press.

The Malala Fund. (2020). Girls' education and COVID-19: What past shocks can teach us about mitigating the impact of pandemics. Accessed at <https://mala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19>.

UN Women. (2020). Guidance note :Addressing the Impacts of the Covid-19 Pandemic on Migrant Workers. Accessed at :

[https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers.](https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-note-addressing-the-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers)

UNICEF. (2020). Future of 370 million children in jeopardy as school closures deprive them of school meals - UNICEF and WFP. 28 April 2020. Retrieved from <https://uni.cf/3e8J0lz>

WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) July 2020, <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>.

الدراسة الثالثة

نحو علاج ناجع لفيروس كوفيد-19

الخلاصة:

لقد تم إعلان كوفيد-19 كجائحة. لقد أثر كوفيد 19 على الملايين حول العالم وقد تم استخدام العديد من التدابير الوقائية للتخفيف من انتشار المرض بما في ذلك التحكم الدقيق في العدوى وعزل المرضى والتبعاد المجتمعي، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية الداعمة عبر الأدوية المضادة للفيروسات والعلاج بالأكسجين. توجد أبحاث مستمرة لإيجاد علاج ناجع لكوفيد 19 من بين الأدوية التقليدية، كما ظهر عدد من اللقاحات حول العالم بنتائج مبشرة.

الكلمات المفتاحية: جائحة - كوفيد 19 - الوفيات - كورونا - فيروس

.....

بحث نشر ضمن المقالات التثقيفية بكلية النسور الجامعة بالعراق

مقدمة

في أتون جائحة عالمية ضرورة لا تعرف حدوداً مثلها فيروس كوفيد-19 مما استلزم في المقابل استجابة إقليمية ودولية طارئة، فحشدت دول العالم كافة مواردها لمواجهة الآثار شديدة الوطأة للجائحة ووضع الجامعات وشركات الأدوية حول العالم في بحثٍ شاقٍ لا ينقطع عن علاج ناجع يضع حدّاً لهذا السيل من الإصابات والوفيات في العالم النامي والمتقدم.

فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكنها إصابة الحيوانات والبشر على السواء، حيث تسبب أمراض الجهاز التنفسى الخفيفة مثل نزلات البرد أو الشديدة مثل الالتهاب الرئوي⁽¹⁾.

قد تظهر أعراض كوفيد 19 بعد يومين إلى 14 يوماً من التعرض له، ويصيب الأطفال والبالغين. وتسمى الفترة التالية للتعرض والسابقة لظهور الأعراض "فترة الحضانة". ومن أعراضها الشائعة ما يلي: الحُمّى - السعال - الإجهاد والتعب، ومن الأعراض المبكرة فقدان حاستي الذوق أو الشم ومن الأعراض الأخرى: صعوبة في التنفس - القشعريرة - آلام العضلات - التهاب الحلق - سيلان الأنف - الصداع - ألم الصدر - العين القرنيفلية

WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) July 2020. Available at .¹
<https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>

(التهاب الملتحمة)- الطفح الجلدي والغشيان والقيء، والإسهال. وتتراوح شدة الأعراض ما بين خفيفة جداً إلى حادة⁽¹⁾.

الأشخاص الأكبر سناً أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض كوفيد 19 الخطيرة، حيث يزداد الخطر كلما تقدم الشخص في العمر. قد يكون المصابون بحالات طبية مزمنة حالية أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة ومنها: أمراض القلب الخطيرة، مثل فشل القلب، أو مرض الشريان التاجي، أو اعتلال عضلة القلب- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)- السكري من النوع الثاني- السمنة- السرطان- مرض الكلى المزمن- مرض الخلايا المنجلية- ضعف جهاز المناعة بسبب عمليات زرع الأعضاء- التدخين- ارتفاع ضغط الدم- الربو- مرض الكبد^(1,2).

وتجري الأبحاث حالياً حول مجموعة من العلاجات التقليدية لدراسة مدى قدرتها على التصدي للفيروس المستجد ومنها:

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER).1 .¹

Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Available at
<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963>

Center for disease control and prevention, corona virus disease 2019 .2²
(COVID-19). <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>

دور مضادات التخثر وكوفيد -19 :

لقد بات معروفاً أن كوفيد-19 يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة للمناعة الذاتية تنتشر بالدم وتهاجم الخلايا محدثة الجلطات في الشرايين والأوردة مما يهدد بحدوث السكتات الدماغية.

ديبييريدامول (Dipyridamole) هو دواء قديم مضاد لتكدس الصفيحات الدموية، حيث يمنع تكوين الجلطات الدموية في الشرايين التاجية ويعمل كمحبط لإنزيمات الفوسفوديستراز (PDE) الذي يزيد من cAMP أو cGMP مما يطيل ويعزز من تأثيرات العمليات الفسيولوجية⁽¹⁾. علاوة على دوره في تمبيع الدم ومنع التخثر والتي أصبح يتفوق عليه الأسبرين فيها، فقد أظهرت التجارب السريرية التي أجريت في الصين أن دواء ديبييريدامول له فاعلية واسعة ضد الفيروسات وبالأخص ضد فيروسات الحمض النووي الرنا، علاوة على أنه يثبط الالتهاب ويعزز من التئام الغشاء المخاطي. ولأنه محبط عام للفوسفوديستراز لذا يمنع الإصابة الحادة والتليف التدرجي للرئة والقلب والكبد والكلى⁽²⁾.

Gresele P, Momi S, Falcinelli E. Anti-platelet therapy: phosphodiesterase .1¹ inhibitors. Br J Clin Pharmacol 2011; 72(4): 634-46
Fata-Hartley CL, Palmenberg AC. mengovirus RNA replication .2²
.Dipyridamole reversibly inhibits. J Virol 2005;425 79(17):11062-70

دور مضادات الالتهاب وكوفيد -19:

تعد عاصفة السيتوكين سبباً شائعاً للوفيات الناتجة عن فيروس كوفيد-19 وهي عبارة عن رد فعل مناعي مفرط يؤدي إلى قيام الخلايا المناعية باعتداء شرس على الرئتين وتلف الأجهزة العضوية الأخرى بالجسم، وقد أفادت الأبحاث التي أجريت في الصين وجود صلة بين زيادة مستويات أنترلوكين 6 (IL-6) وخطر الوفاة⁽¹⁾.

يعد رالوكسيفين (bazedoxifene) وبازيدوكسيفين (Raloxifene) من الأدوية الحديثة للوقاية والعلاج من هشاشة العظام خاصة بعد انقطاع الطمث، يعتبر "رالوكسيفين" و"بازيدوكسيفين" من العوامل الانتقائية لمستقبلات هرمون الأستروجين فضلاً عن نشاط قوي مضاد للفيروسات. وتشير الدراسات الحديثة إلى دورٍ واعدٍ للدوائين في منع عاصفة السيتوكين، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والتي تصاحب كوفيد -19 وتسبب الوفاة عبر منع إشارات IL-6 في الجرعات العلاجية

Smetana K Jr, Brábek J. Role of interleukin-6 in lung complications in ¹ patients with COVID-19: Therapeutic implications. In Vivo 2020;34: 1589-1592. PMID: 32503815. DOI: 10.21873/invivo.11947

المعتادة. وقد أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخراً الدوائين لتقليل معدلات الوفيات في الحالات الشديدة⁽¹⁾.

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وكوفيد -19: الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (Monoclonal antibody) هي نوع من الجزيئات البروتينية التي تنتج في المختبر وتسمى بالعلاجات المستهدفة؛ لأنها تعمل عبر استهداف بروتينات محددة على سطح الخلايا وعادة ما تستخدم في حالات الأورام والتهاب المفاصل. ومع ارتباط كوفيد-19 بعاصفة السيتوكين أصبح العديد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة قيد الاختبار ومنها كاناكينوماب (Canakinumab) والذي يستهدف -IL-1β وتحري الدراسات حول مدى نجاعته في الحالات شديدة الخطورة وكبار السن⁽²⁾.

وقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دواء باملانيفيما (Bamlanivimab) ترخيص الاستخدام الطارئ لعلاج حالات كوفيد-

Smetana K, Rosel D, BrÁbek J. Raloxifene and Bazedoxifene Could Be .¹ Promising Candidates for Preventing the COVID-19 Related Cytokine Storm, .ARDS and Mortality. In Vivo 2020; 34(5): 3027-3028 Ucciferri C, Auricchio A, Di Nicola M, et al. Canakinumab in a subgroup of .² patients with COVID-19. The Lancet Rheumatol. 2020; 2: e457- ee458

19 الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى والذين تبلغ أعمارهم **12** عاماً أو أكثر، ويزنون **40** كجم على الأقل، والذين لم يكن لديهم مضاعفات بما يكفي لطلب العلاج بالمستشفى، لكنهم معرضون وبشكل كبير للوصول إلى هذه المرحلة. كما يشمل المرضى الذين تزيد أعمارهم عن **65** عاماً، أو الذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة. ومع ذلك فقد شددت على أنه لا ينبغي إعطاء باملانيفيماب للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين؛ لأن العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة قد يؤدي إلى تفاقم النتائج لدى هؤلاء المرضى⁽¹⁾.

كوكتيل جديد من الأجسام المضادة ضد كوفيد-19 وتجري الدراسات حالياً على استخدام كوكتيل من الأجسام المضادة REGN-COV2 للوقاية والعلاج في آنٍ واحدٍ، وهو مكون من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، ومن مزايا هذا الكوكتيل أنه يمنع

Mahase E. Covid-19: FDA authorizes neutralising antibody bamlanivimab.¹
.for non-admitted patients. BMJ 2020; 371 :m4362
.doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.m4362>

الأشكال الطافرة الطبيعية للفيروس التي نشأت أثناء هذا الوباء من الهروب من العلاج⁽¹⁾.

دور علاج السكري وكوفيد -19:

كما أشرنا في السابق ترتبط المرحلة الشديدة من كوفيد-19 بعاصفة السيتوكين الالتهابية، والتي تتسبب في تلف العديد من الأعضاء الحيوية بالجسم، ولمسار NF-kappa-B دور هام في هذه العاصفة. ونظرًا للارتباط الوثيق بين مرض السكري والالتهاب، فقد شددت الدراسات على أن مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى كوفيد-19.

تلعب مثبطات ثانوي بيتيديل بيتيداز-4 (DPP4) دوراً هاماً، فبالإضافة إلى تأثيرها المضاد لمرض السكري فيمكنها أن تمنع تكاثر الخلايا التائية وإنتاج السيتوكينات المسببة للالتهابات، وبالتالي تقليل شدة الالتهاب عبر التأثير على مسار إشارات NF-kappa-B. ومن أمثلة مثبطات DPP4: دواء سิตاجليپتين (sitagliptin). لذلك يمكننا القول أن الالتهاب

Regeneron Pharmaceuticals Inc. Developing REGN-COV2 A Novel Antiviral.¹
Antibody Cocktail. Available at <https://www.regeneron.com/covid19>

بمثابة الجسر الرابط بين مرض السكري وكوفيد-19، والذي يمكن إدارته
عبر سيتاجليبتين⁽¹⁾.
دور مخفضات الكوليسترون وكوفيد-19:

تشتهر أدوية الستاتينات الخاضة للكوليسترون (Statin) بآثارها
المضادة للالتهابات، كما أنها تمارس نشاطاً مضاداً للفيروسات بحسب بعض
الدراسات عبر تثبيط عمل إنزيم البروتياز وهو إنزيم رئيس لفيروس
كورونا وبالتالي فهو هدف دوائي محتمل⁽²⁾.
علاج إدمان الكحول وكوفيد-19:

تجري دراسة حول دواء ديسulfiram (Disulfiram) والذي يستخدم منذ
أكثر من 50 عاماً لعلاج إدمان الكحول في محاربة فيروس كوفيد-19
وذلك بجامعة كاليفورنيا، حيث يمتلك خواص مضادة للفيروسات فضلاً
عن كونه مضاداً للالتهابات⁽³⁾.

Solerte SB, Trevisan FR, Lovati E, Rossi A et al. Sitagliptin treatment at the ¹
time of hospitalization was associated with reduced mortality in patients
with type 2 diabetes and COVID-19:A Multicenter, case-control,
Retrospective, Observation study. Diabetes Care 2020;doi:10.2337/dc20-
.1521

Bifulco M ,Gazzerro P. Statins in coronavirus outbreak: It's time for ²
.experimental and clinical studies. Pharmacol. Res 2020; 156, 104803
ClinicalTrial.gov. Disulfiram for COVID-19(DISCO)Trial(DISCO).Available at ³
.https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04485130

استخدام عقار إيفر مكتين مع دوكسيسيكلين لعلاج مرضي كوفيد-19: في دراسة أسترالية قدمها معهد موناش للطب الحيوي ومعهد بيتر دوهري للعدوى والمناعة أكدت أن دواء إيفر مكتين (Ivermectin) قادر على

كبح جماح فيروس كورونا مختبرياً في غضون 48 ساعة.

إيفر مكتين من الأدوية المضادة للطفيليات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) ويستخدم منذ السبعينيات من القرن الماضي في علاج عدوى قمل الرأس والجرب والأسكارس وداء الفيل وغيرها.

وطبقاً للدراسة والتي اعتمدت على استخدام جهاز RT-PCR في فحص الرنا الفيروسي لكورونا، فقد استطاع إيفر مكتين أن يحدث انخفاضاً في المحتوى الوراثي الفيروسي بنسبة 93٪، وفي الوقت نفسه استطاع أن ينال من قدرة الفيروس على التكاثر داخل الخلية بنسبة 99.8٪.

ولقد أشارت دراسات سابقة لامتلاك (إيفر مكتين) لتأثير مثبط للفيروسات مثل دوره الفعال في علاج سارس المتنامي لنفس عائلة كورونا، وكذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة وحمى الضنك، وتعتمد آلية عمل إيفر مكتين مع الفيروسات ذات محتوى الرنا على كبح (importin αβ) وهو مسار يحكم عملية التكاثر

الفيروسي داخل الخلية ولا زال الوقت مبكراً للحكم إذا كان هذا المسار ذاته يحكم تكاثر كورونا⁽¹⁾.

بحسب الدراسات أدى الجمع بين مضاد الطفيليات إيفرمكتين (Doxacycline) مع المضاد الحيوي الدوكسيسيكلين (Ivermectin) إلى التقليل من وقت الشفاء وخفض معدل الوفيات في المرضى الحادة من 22.72% إلى 0%؛ ومع ذلك، توفي 18.2% من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مع العلاج بالإيفرمكتين والدوكسيسيكلين. إذا أخذنا معًا، أما إذا تناول الإيفرمكتين في وقت سابق مع الدوكسيسيكلين، كان أفضل وأعلى معدلًاً كعلاج ناجع⁽²⁾.

Caly L, Druce J D, Catton MG, Jans DA, Wagstaff K M. The FDA-approved .1¹ drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research2020; 178, [104787].

<https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787>

Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir .2² AS. Controlled randomized clinical trial on using Ivermectin with Doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad, Iraq. Preprint from medRxiv, 27 Oct 2020.DOI: 10.1101/2020.10.26.20219345

References :

- Bifulco M, Gazzero P. Statins in coronavirus outbreak: It's time for experimental and clinical studies. *Pharmacol. Res.* 2020; 156, 104803.
- Caly L, Druce J D, Catton MG, Jans DA, Wagstaff K M. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. *Antiviral Research* 2020; 178, [104787].
<https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787>
- Center for disease control and prevention, corona virus disease 2019 (COVID-19).
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.
- ClinicalTrial.gov. Disulfiram for COVID-19(DISCO)Trial (DISCO). Available at
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04485130>.
- Fata-Hartley CL, Palmenberg AC. mengovirus RNA replication Dipyridamole reversibly inhibits. *J Virol* 2005;425 79(17):11062-70.
- Gresele P, Momi S, Falcinelli E. Anti-platelet therapy: phosphodiesterase inhibitors. *Br J Clin Pharmacol* 2011; 72(4): 634-46.
- Hashim HA, Maulood MF, Rasheed AM, Fatak DF, Kabah KK, Abdulamir AS. Controlled randomized clinical trial on using Ivermectin with Doxycycline for treating COVID-19 patients in Baghdad, Iraq. Preprint from medRxiv, 27 Oct 2020.DOI: 10.1101/2020.10.26.20219345

Mahase E. Covid-19: FDA authorizes neutralising antibody bamlanivimab for non-admitted patients. BMJ 2020; 371: m4362. doi:
<https://doi.org/10.1136/bmj.m4362>.

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Available at <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963>.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. Developing REGN-COV2 A Novel Antiviral Antibody Cocktail. Available at <https://www.regeneron.com/covid19>

Smetana K Jr, Brábek J. Role of interleukin-6 in lung complications in patients with COVID-19: Therapeutic implications. In Vivo 2020;34: 1589-1592. PMID: 32503815. DOI: 10.21873/invivo.11947.

Smetana K, Rosel D, BrÁbek J. Raloxifene and Bazedoxifene Could Be Promising Candidates for Preventing the COVID-19 Related Cytokine Storm, ARDS and Mortality. In Vivo 2020; 34(5): 3027-3028.

Solerte SB, Trevisan FR, Lovati E, Rossi A et al.

Sitagliptin treatment at the time of hospitalization was associated with reduced mortality in patients with type 2 diabetes and COVID-19: A Multicenter, case-control, Retrospective, Observation study. Diabetes Care 2020; doi:10.2337/dc20-1521.

Ucciferri C, Auricchio A, Di Nicola M, et al.
Canakinumab in a subgroup of patients with COVID-19. *The Lancet Rheumatol.* 2020; 2: e457- ee458.
WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) July 2020. Available at <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>.

الدراسة الرابعة

التجارب العلاجية لفيروس كوفيد-19 إلى أين؟

الخلاصة:

على الرغم من توافر العديد من اللقاحات في الآونة الأخيرة لتوفير الحماية والوقاية للبشر حول العالم إلا أن هذا لم يمنع كبريات الجامعات والمعامل البحثية من السير قدماً للبحث عن علاج ناجع لكورونا - 19 بين الأدوية التقليدية الشهيرة أو تقديم علاج جديد يضع حدًا لحالات الإصابة المستمرة حول العالم.

الكلمات المفتاحية: عدوى - كوفيد 19 - بحث - لقاح - فيروس

Abstract:

Despite the availability of many vaccines recently to provide protection and prevention for humans around the world, this did not prevent major universities and research laboratories from moving forward to search for an effective treatment for Covid-19 among the famous traditional medicines or introducing a new treatment that puts an end to the continuous cases of infection around the world.

Key words: Infection - COVID 19 - Research - Vaccine - Virus

مقدمة

مع دخولنا العام الجديد 2021 لا يزال الاهتمام منصبًا على جائحة كوفيد 19 التي ما زالت تعصف بالأمن الصحي العالمي.

بالطبع ثمة فروق جلية بين الوضع حالياً وما كان عليه الوضع آنفًا مع بدايات اكتشاف الفيروس، ذلك أنّ عدداً من اللقاحات تم تصنيعها مؤخراً منها لقاح فايزر بيونتك ومودerna لكن يبدو أن التحدي لا زال قائماً مع تحور الفيروس مؤخراً.

تعتمد فكرة لقاحات فايزر بيونتك ومودerna على استخدام نسخة اصطناعية من المادة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، وهي الحمض النووي الريبيوري المرسال mRNA مما يحفز الجهاز المناعي للجسم لإنتاج أجسام مضادة قادرة على التصدي للفيروس الحقيقي عند مهاجمته الجسم فهو أشبه بالرسالة التي توجه للجهاز المناعي ليكون الجسم في حالة الماجاهزية المستمرة وعلى الرغم من أمان اللقاح من الناحية النظرية إلا أن الوقت لا زال مبكراً للحكم من الناحية العملية لحداثة هذه التكنولوجيا.

وقد استثنى من اللقاح الأطفال والحوامل والمرضعات لعدم كفاية الدراسات حول سلامة الاستخدام في هذه الحالات⁽¹⁾.

وقد حصل لقاح فايزر بيونتك على تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويطلب أخذ حقنتين يفصل بينهما 21 يوماً. وبحسب الشركتين المصنعتين فتبلغ نسبة الفاعلية للقاح فايزر بيونتك 95% بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية. ويعني هذا أن أكثر من 95% من الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح سيتمتعون بالحماية من الإصابة بمرض شديد ناتج عن فيروس كورونا المستجد، لكن اللقاح يحتاج إلى درجة حفظ 70 درجة مئوية تحت الصفر مما جعله ليس الخيار الأمثل لبعض الدول النامية⁽²⁾.

كما حصل لقاح مودerna على تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويطلب أخذ حقنتين يفصل بينهما 28 يوماً وبفاعلية 94.1%⁽²⁾

Center for disease control and prevention, understanding mRNA COVID-¹ 19 vaccines. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html>

Center for disease control and prevention, Facts about COVID-19². vaccines. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html>

في المقابل يمثل اللقاح الصيني سينوفارم خياراً مثالياً لبعض الدول النامية حيث يحفظ في الثلاجات العادية وسط ضبابية شديدة فيما يتعلق بدرجة فاعليته وأمانه في ظل غياب الدراسات الكافية حوله ويقوم على الفكرة التقليدية في صناعة اللقاحات من الاعتماد على حقن جزيئات فيروسية ميتة غير نشطة.

أدى إعلان بريطانيا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد إلى حالة من الذعر حول العالم، فأغلقت دول عدّة حول العالم مجاهها الجوي وقد جاء الإعلان في أعقاب حالة من الأمل بعثها اكتشاف اللقاحات أخيراً. لكن هذا الإعلان عصف بحالة الأمل تلك وسط مخاوف من عودة الفيروس بصورة المتحورة للانتشار من جديد وبصورة أسرع وسط توقع ذلك بنسبة قد تصل إلى 70% مما يهدد بالخروج عن دائرة السيطرة مرة أخرى وسار التساؤل حول جدوا اللقاحات الحالية.

ومع الإعلان البريطاني عن السلالة الجديدة سارعت ألمانيا إلى طمأنة العالم والإعلان أن اللقاحات الحالية تمتلك الفاعلية الكافية للتصدي للسلالة الجديدة، ويرجع هذا التفاؤل إلى أن اللقاحات فايزر بيونتك ومودerna تدرّب جهاز المناعة على مهاجمة بروتين سبايك للفيروس من عدة أجزاء للتغلب على مسألة الطفرات المحتملة.

بحسب الدراسات الأولية فالتحور قد حدث في بروتين سبائك و هو الذي يمنح الفيروس المستجد شكله التاجي الشهير علاوة عن كونه المفتاح لدخول الفيروس لخلايا الجسم فضلاً عن أنه الهدف الأساسي للقاحات الرئيسة الحالية وللعلاج بالأجسام المضادة، وقد حدثت الطفرة N501Y في الجزء الأكثر أهمية من بروتين سبائك والخاص بالتلامس والارتباط بخلايا الجسم، وهي منطقة ارتباط المستقبلات receptor binding ما يسهل من اختراق الفيروس لخلايا الجسم و يجعله أكثر حدة وقدرة على العدوى. إضافة لدراسات أخرى تشير إلى طفرة أخرى هي حذف جزء صغير من بروتين سبائك وهو H69/V70 وقد تم اكتشافها في السابق لدى حيوانات المنك المصابة بكورونا، مما يجعل الأجسام المضادة في أجساد المتعافين أقل فاعلية في صد الصورة المتحورة الجديدة من الفيروس⁽¹⁾.

على صعيد الأعراض الجديدة المصاحبة لكوفيد 19 فقد تمت الإشارة إلى لسان كوفيد وهو عبارة عن طبقة تشبه الفرو على اللسان يمكن أن تكون بيضاء أو صفراء ولا يمكن إزالتها ليضاف لقائمة الأعراض الأقل

Penn Medicine Physician Blog .Confirmed at Penn, A New Strain of SARS-.¹
CoV-2 Arrives in
Philadelphia.<https://www.pennmedicine.org/updates/blogs/penn-physician-blog/2021/January/sarscov2-variant-b117-article>

شيوعاً جنباً إلى جانب مع الأوجاع والتهاب الحلق والإسهال والتهاب الملحة والطفح الجلدي وتغير لون أصابع اليد أو القدم⁽¹⁾.

وعلى صعيد الكشف المبكر عن كوفيد 19 اعتمدت الصين المسحة الشرجية عبر إدخال سلك بلاستيكي مزود بقطنة في فتحة الشرج لمسافة ثلاثة إلى خمسة سنتيمترات داخل المستقيم وعلى الرغم من اقتصار هذه الطريقة على الحالات عالية الخطورة استخدمتها الصين خشية تزايد الإصابات في أعقاب احتفالات السنة الصينية في 12 فبراير المقبل⁽²⁾.

وفيما يخص السؤال المحير منذ فترة حول استمرار إيجابية المسحة لدى البعض على الرغم من تعافيهم من كورونا المستجد وخلوهم من الأعراض فقد نجح فريق من الباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد في تقديم تفسير مثير لذلك حيث ذهبت الدراسة إلى أن جينوم RNA الخاص بكوفيد - 19 يمكنه الاندماج مع الحمض النووي للクロموسومات البشرية DNA مختبرياً باستخدام جين إنزيم النسخ العكسي والذي يجعل RNA إلى DNA وبالتالي يبقى الفيروس مختبئاً في

Webmed Health News. COVID Tongue May Be a Symptom, Professor .¹
Says.<https://www.webmed.com/lung/news/20210129/covid-tongue-may-be-a-symptom-professor-says>

Webmed Health Brief. China Using Anal Swabs for COVID Testing. ²
<https://www.webmed.com/lung/news/20210128/china-using-anal-swabs-for-covid-testing>

مكان غير متوقع داخل كروموسومات الخلايا البشرية ولكن ليس بشكل دائم، وتأتي هذه التجربة بنتائج على خلاف المشهور بين العلماء من أن الفيروسات تقوم بإدخال حمضها النووي **RNA** في الخلايا المصابة، ولكن يبقى في معزل عن الحمض النووي للخلية **DNA**⁽¹⁾.

Zhang L, Richards A, Khalil A, et al. SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed.¹ and integrated into the human genome.bioRxiv. Published online Dec 14, 2020. doi: <https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516>

أبرز التجارب الدوائية الحالية على كوفيد 19

١-الدوكسيسايكلين والأزيثرومایسين والمراحل الأولى:

كشفت دراسة تابعة لجامعة أوكسفورد أطلق عليها (PRINCIPLE) أن استخدام هذين المضادين في المرحلة المبكرة من المرض غير فعال في تقليل الوقت المستغرق في الشعور بالشفاء أو الحيلولة دون الحاجة لدخول المستشفى، وبالتالي لن يساعدان معظم مرضى كوفيد 19 في المراحل المبكرة من مرضهم خاصة المرضى فوق 50 عاماً الذين تم علاجهم في المنزل. وأن الاستخدام المجتمعي المفرط للمضادين في حالة عدم وجود التهاب رئوي جرثومي مشتبه به من شأنه اتساع رقعة مقاومة المضادات الحيوية. شملت الدراسة إعطاء 526 شخصاً علاج الأزيثرومایسين بجرعة 500 ملجم يومياً لمدة 3 أيام و 798 شخصاً تم إعطاؤهم الدوكسيسايكلين بجرعة 200 ملجم في اليوم الأول ثم 100 ملجم في الأيام التالية لمدة 6 أيام^(١).

....

PRINCIPLE. Azithromycin and doxycycline are not generally effective ¹. against COVID-19 in patients treated at home, shows PRINCIPLE trial.

Published online Jan 25, 2021.

<https://www.principletrial.org/news/azithromycin-and-doxycycline-are-not-generally-effective-treatments-for-covid-19-shows-principle-trial>

2- الأنترفيرون ألفا:

الأنترفيرونات هي مجموعة من البروتينات المناعية التي ينتجهما الجسم لمواجهة الفيروسات وتنظيم مناعة الجسم تجاه الأورام، لذلك فهي تفيد في علاج الفيروسات وفي دراسة نشرتها مجلة **The Lancet** أثبت الأنترفيرون ألفا فاعليته في خفض معدل الوفيات بـ كوفيد بنحو ثلاثة مرات. كما تشير الدراسات إلى دورٍ وقائيٍ تلعبه قطرات الأنف أنترفيرون ألفا في توفير الوقاية للممارسين الصحيين. مؤخراً أدرجت وزارة الصحة الروسية قطرات الأنف أنترفيرون ألفا في التوصيات الخاصة بمكافحة كوفيد-19⁽¹⁾.

.....

3- الكولشيسين:

في دراسة بمعهد مونتريال لأمراض القلب أثبتت أن كولشيسين المستخلص من زهرة اللحلاح، ذا الخواص المضادة للالتهابات والمستخدم في علاج النقرس وحمى البحر المتوسط فعال في علاج مرضي كوفيد والتقليل من مضاعفاته، حيث أنه فعال في منع عواصف السيتوكين وهي رد فعل مناعي عنيف يفرز فيه الجهاز المناعي بروتينين السيتوكينين بشكل

Meng, Z, Wang, T, Li, C, et al. An experimental trial of recombinant human ¹ interferon alpha nasal drops to prevent coronavirus disease 2019 in medical staff in an epidemic area. medRxiv. Published online May 7, 2020.
.doi:10.1101/2020.04.11.20061473

مفرط مما يؤدي إلى تلف الأعضاء وفي مقدمتها الرئتين. يعمل كولشيسين على تهدئة العاصفة عبر تثبيط IL-1α مما يؤدي إلى خفض الحاجة لدخول المستشفى بنسبة 25% وال الحاجة للتنفس الصناعي بنسبة 50% وخفض نسبة الوفيات بنسبة 44% وقد اعتمده وزارة الصحة اليونانية في بروتوكوها ليكون صرفة بناءً على وصفة طبية للمرضى الذين تخطوا عمر 60 ويتلقون العلاج بالمنزل ويكون العلاج موزعاً بجرعات محددة على فترتين زمنيتين^(2,1) طيلة الأيام الثلاث الأولى يعطى صباحاً ومساءً 0.5 ملجم، ثم بعد ذلك جرعة صباحية فقط 0.5 ملجم لمدة 27 يوماً.

....

4-العلاج بالخلايا الجذعية:

الخلايا الجذعية هي الخلايا الخام بالجسم أي الخلايا التي تتولد منها جميع الخلايا الأخرى ذات الوظائف المتخصصة، وتستخدم هذه التقنية في توليد خلايا سليمة لتحمل محل الخلايا المريضة.

Nasiripour S, Zamani F, Farasatinasab M. Can colchicine as an old anti-¹ inflammatory agent be effective in COVID-19? J Clin Pharmacol .2020;60(7):828-829

ClinicalTrial.gov. Colchicine Coronavirus SARS-CoV2 Trial (COLCORONA) .2 (COVID-19). <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322682>. Accessed June 15, 2020

في دراسة أجرتها جامعة ميامي أثبتت أن استخدام الخلايا الجذعية الموجودة بالحبل السري للأطفال حديثي الولادة قد تكون طوق النجاة لمرضى كوفيد 19 الذين تقل أعمارهم عن 85 عاماً.

حيث تعمل الخلايا الجذعية على التقليل من آثار عاصفة السيتوكين المسببة للوفاة عبر تقليل الالتهاب من خلال تقليل البروتين التفاعلي C و IL-6 و IL-8 و TNF-alpha وزيادة مستوى البروتين المضاد للالتهاب IL-10 كما تساعد على إعادة تكوين الخلايا التالفة^(2,1).

....

5-سانوتيز:

توصل باحثون كنديون إلى أن البخاخ الأنفي سانوتيز الذي يدخل في تركيبته أكسيد النيتروز قادر على قتل كوفيد - 19 بنسبة 99.9%. وغاز أكسيد النيتروز هو غاز عديم اللون وعند استنشاقه يعمل على توسيع الأوعية الدموية خاصة في الرئتين مما يؤدي إلى زيادة كمية الأكسجين المتدايق إليها ولجميع أنحاء الجسم، ويستخدم مع جهاز التنفس الصناعي

Chen J, Hu C, Chen L, et al. Clinical study of mesenchymal stem cell treating ¹ acute respiratory distress syndrome induced by epidemic influenza A (H7N9) infection, a hint for COVID-19 treatment. Engineering (Beijing). 2020; .6: 1153- 1161

Yip HK, Fang WF, Li YC, et al. Human umbilical cord-derived mesenchymal .2 stem cells for acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2020; 48: .e391- e399

للحيلولة دون فشل الجهاز التنفسى لدى الأطفال حديثي الولادة. كما تشير بعض الدراسات إلى امتلاك غاز أكسيد النيتريك خصائص مضادة للفيروسات التاجية⁽¹⁾.

....

6- مثبطات الفوسفوديستريز -12:

وعلى صعيد الأبحاث الطريفة التي قد تقود إلى علاج لكورونا - 19 ربط الباحثون بين الجينات الموروثة من إنسان نياندرتال والإصابة بكورونا ودرجة شدتها والتعافي منها وإنسان نياندرتال أو الإنسان البدائي هو أحد أنواع جنس هومو الذي استوطن أوروبا وأجزاء من آسيا وانقرض منذ أربع عشرين ألف سنة.

وبحسب دراسة قادتها جامعة ماكجيل في كندا فالأشخاص الذين يحملون نسخة من الجين الموروث من إنسان نياندرتال (OAS1) هم أقل عرضة للإصابة والوفاة من كوفيد - 19، حيث أن هذا الجين يتحكم في استجابة الجسم للفيروسات وأن الأشخاص الذين يحملون مستوى مرتفع من النسخة البروتينية p46 من OAS1 يتمتعون بنشاط مضاد الفيروسات أعلى وبالتالي نسبة إصابة أقل (5%). وكذلك نسبة أقل في خطر دخول

ClinicalTrial.gov. Nitric Oxide Releasing Solutions to Prevent and Treat .¹
Mild/Moderate COVID-19 Infection (NOCOVID). Available at
. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04337918>

المستشفى (٩٪) مقارنة بنظرائهم من يمتلكون نسبة أقل من هذا البروتين. مثبطات الفوسفوديستريز -12 من شأنها زيادة OAS1 مما ينعكس على فرص الإصابة والخطورة^(٢,٣,٤).

....

7-الهيبارين:

الهيبارين هو مضاد للتخثر يستخدم لمنع الجلطات لدى المرضى الذين خضعوا لجراحات وبحسب الدراسات فالهيبارين وريميديسيفير لهما نشاط مثبط مماثل تقريباً للفيروس، لكن لا يزال استخدام الهيبارين في حالة عدم وجود جلطة دموية مثبتة أو مشتبه بها لدى مرضى كوفيد كعلاج مسألة جدلية، وقد ذهبت بعض الدراسات لفاعالية الطحالب البحرية في مكافحة كوفيد، وذلك لاحتوائها على الهيبارين لكن أثبتت الدراسات

Hugo Zeberg, A. & Pääbo, S. A genetic variant protective for COVID-19 is .¹
.inherited from Neanderthals. bioRxiv 2020

Carey, C. M. et al. Recurrent Loss-of-Function Mutations Reveal Costs to .²
OAS1 Antiviral Activity in Primates. Cell Host Microbe 2019.
.doi:10.1016/j.chom.2019.01.001

Zeberg, H. & Pääbo, S. The major genetic risk factor for severe COVID-19 is .³
.inherited from Neanderthals. Nature 2020.doi:10.1038/s41586-020-2818-3

مؤخراً أن إعطاء الهيبارين غير المجزأ يزيد من المضاعفات لدى المرضى
 أصحاب البشرة السمراء كإصابات الكلى والقلب وفقر الدم^(١٤).

References:

- Carey, C. M. et al. Recurrent Loss-of-Function Mutations Reveal Costs to OAS1 Antiviral Activity in Primates. *Cell Host Microbe* 2019. doi: 10.1016/j.chom.2019.01.001.
- Center for disease control and prevention, understanding mRNA COVID-19 vaccines.
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html>.
- Center for disease control and prevention, Facts about COVID-19 vaccines.
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits-facts.html>.
- Chen J, Hu C, Chen L, et al. Clinical study of mesenchymal stem cell treating acute respiratory distress syndrome induced by epidemic influenza A (H7N9) infection, a hint for COVID-19 treatment. *Engineering (Beijing)*. 2020; 6: 1153- 1161.

Hippensteel JA, Lariviere WB, Colbert JF, et al. Heparin as a therapy for COVID-19: current evidence and future possibilities. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2020;319(2): L211-L217.doi:10.1152/ajplung.00199.2020¹

- ClinicalTrial.gov. Colchicine Coronavirus SARS-CoV2 Trial (COLCORONA) (COVID-19).
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322682>. Accessed June 15, 2020.
- ClinicalTrial.gov. Nitric Oxide Releasing Solutions to Prevent and Treat Mild/Moderate COVID-19 Infection (NOCOVID). Available at
<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04337918>.
- Hippensteel JA, Lariviere WB, Colbert JF, et al. Heparin as a therapy for COVID-19: current evidence and future possibilities. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*.2020;319(2): L211-L217.doi:10.1152/ajplung.00199.2020.
- Hugo Zeberg, A. & Pääbo, S. A genetic variant protective for COVID-19 is inherited from Neanderthals. *bioRxiv* 2020.
- Meng, Z, Wang, T, Li, C, et al. An experimental trial of recombinant human interferon alpha nasal drops to prevent coronavirus disease 2019 in medical staff in an epidemic area. *medRxiv*. Published online May 7, 2020. doi:10.1101/2020.04.11.20061473.
- Nasiripour S, Zamani F, Farasatinasab M. Can colchicine as an old anti-inflammatory agent be effective in COVID-19? *J Clin Pharmacol* 2020;60(7):828-829.
- Penn Medicine Physician Blog. Confirmed at Penn, A New Strain of SARS-CoV-2 Arrives in Philadelphia.<https://www.pennmedicine.org/updates/bl>

[ogs/penn-physician-blog/2021/January/sarscov2-variant-b117-article](https://penn-physician-blog/2021/January/sarscov2-variant-b117-article).

PRINCIPLE. Azithromycin and doxycycline are not generally effective against COVID-19 in patients treated at home, shows PRINCIPLE trial. Published online Jan 25, 2021.

<https://www.principletrial.org/news/azithromycin-and-doxycycline-are-not-generally-effective-treatments-for-covid-19-shows-principle-trial>.

Webmed Health Brief. China Using Anal Swabs for COVID Testing.

<https://www.webmed.com/lung/news/20210128/china-using-anal-swabs-for-covid-testing>.

Webmed Health News. COVID Tongue May Be a Symptom, Professor

Says.<https://www.webmed.com/lung/news/20210129/covid-tongue-may-be-a-symptom-professor-says>.

Yip HK, Fang WF, Li YC, et al. Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells for acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2020; 48: e391- e399.

Zeberg, H. & Pääbo, S. The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals. Nature 2020.doi:10.1038/s41586-020-2818-3.

Zhang L, Richards A, Khalil A, et al. SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome. bioRxiv. Published online Dec 14, 2020. doi: <https://doi.org/10.1101/2020.12.12.422516>.

السيرة الذاتية للمؤلف

د. محمد فتحي عبد العال

من مواليد الزقازيق محافظة الشرقية بمصر عام 1982

المؤهلات العلمية:

1-بكالوريوس صيدلة جامعة الزقازيق 2004.

2-دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا التطبيقية جامعة الزقازيق

.2006

3-ماجستير في الكيمياء الحيوية جامعة الزقازيق 2014.

4-دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من المعهد العالي

للدراسات الإسلامية 2017.

5-شهادة إعداد الدعاة من المركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف

.2017

6-دبلوم مهني في إدارة الجودة الطبية الشاملة من أكاديمية السادات

للعلوم الإدارية 2017.

المؤلفات الفكرية:

- 1- كتاب تأملات بين العلم والدين والحضارة - دار الميدان للنشر والتوزيع في جزأين 2019 و 2020.
- 2- كتاب مرآة التاريخ - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2020.
- 3- كتاب على هامش التاريخ والأدب - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2021.
- 4- كتاب جائحة العصر (الجزء الأول) - دار النيل والفرات للنشر 2020.
- 5- كتاب حكايات الأمثال - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2021.
- 6- كتاب فانتازيا الجائحة - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2022.
- 7- كتاب صفحات من التاريخ الأخلاقي بمصر - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2022.
- 8- كتاب حكايات من بحور التاريخ - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2021.
- 9- كتاب حواديت المحروسة - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2022.

10- كتاب من سجايا رمضان أسماء الله الحسنى - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2022.

11- كتاب تانزاکو السعادة - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2022.
الروايات والمجموعات القصصية:

1- رواية ساعة عدل-دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2020.
2- رواية خريف الأندلس-دار لوتس للنشر الحر 2021.

3- المجموعة القصصية في فلك الحكايات - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2021.

4- المجموعة القصصية حتى يحبك الله-دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2022.

5- مسرحية أقدام على جسر الشوك - دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2022.

وقد شاركت الكتب بمعارض القاهرة والإسكندرية والسودان وإسطنبول وعمان وتونس.
الكتب الإلكترونية:

1- كتاب نسائم القلب (هايكي)

المشاركات في كتب جماعية:

أولاًً: في مجال الكتب العلمية:

- 1- المشاركة في كتاب الأمن الصحي كأحد مهدّدات الأمن القومي والمجتمعي العالمي الصادر عن المركز الديمقراطي العربي ببرلين بألمانيا ببحث تحت عنوان "جائحة كورونا خيارات علاجية 2020".
- 2- المشاركة بمقال علمي تحت عنوان "نحو علاج ناجع لفيروس كوفيد 19" في الكراس العلمي الإلكتروني لكلية النسور الجامعية بالعراق "مقالات تثقيفية خاصة بكوفيد 19" 2021.

- 3- المشاركة ببحث في الكتاب الجماعي الرابع لسلسلة الدراسات الاجتماعية - مجتمع الكورونا إلى أين التداعيات والرهانات الصادر عن مخبر البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية لجامعة 20 أكتوبر 1955 سكيكدة الجزائر 2022.

ثانياً: المشاركة في كتب جماعية في مجال القصة القصيرة والمقال:

- 1- كتاب ديوان العرب الجزء الثالث (المقال)-دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2020.

- 2-كتاب أقلام عابرة (قصص قصيرة)-دار ديوان العرب للنشر والتوزيع .2021**
- 3-كتاب صليل الحروف موسوعة أدبية الجزء الثاني (قصص قصيرة) -دار ديوان العرب للنشر والتوزيع 2021.**
- 4-كتاب سفراء الدهشة (قصص) -دار يسطرون للطباعة والنشر 2022.**
- 5-كتاب قصتي لك (قصص قصيرة) -دار كيانك للنشر والتوزيع 2022.**
- 6-كتاب على جناح الحلم (قصص قصيرة) دار لوتس للنشر الحر 2021.**
- 7-كتاب حينما نطرق الأبواب (مقالات) دار لوتس للنشر الحر 2022**
- 8-كتاب افتراضي (قصص قصيرة) تحت إشراف دكتور عصام محمود أستاذ النقد الأدبي جامعة حلوان -دار السعيد للنشر والتوزيع 2022.**
- 9-الكتاب الذهبي مئة قصة لمئة مبدع من 11 دولة -مؤسسة روز اليوسف 2021**
- 10-كتاب دفتر وقلم شموع عربية الجزء الثاني -دار جين للنشر والتوزيع-ليبيا**

11-من إبداعات الملتقى قصص قصيرة -دار الملتقى للنشر والتوزيع .2020

الجوائز والتكريمات التي حصل عليها:

- 1-صيدلي مثالي من الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية 2017 .**
- 2-صيدلي مثالي من نقابة صيادلة الشرقية 2015 ودرعي نقابة صيادلة الشرقية ونقابة صيادلة مصر.**
- 2- درع ملتقى ابن النيل الأدبي في القصة القصيرة 2021.**
- 3-شهادة تكريم ضمن الفائزين في مسابقة القصة القصيرة من مؤسسة روز يوسف "مائة قصة لمئة مبدع من 11 دولة" في كتابها الذهبي 2021 .**
- 4-شهادة تقدير من نقابة صيادلة الجيزة ولجنة الثقافة والإبداع ضمن فاعليات مهرجان الإبداع الصيدلي الخامس .2021**
- 5-درع التميز والإبداع من مجلة اamarji العراقية 2018.**
- 6-شهادة تقدير من مهرجان الإبداع والمبدعين العرب في دورته الخامسة تحت رعاية دار جين للنشر والتوزيع بمدينة البيضاء في ليبيا في ديسمبر 2020.**

الحوارات واللقاءات:

- 1**-لقاءات مع التليفزيون المصري برنامجي بالريشة والقلم وأنا من البلد دي.
- 2**-لقاءات مع الإذاعة الفرنسية راديو مونت كارلو والإذاعة المصرية. بالإضافة لعدد من اللقاءات الصحفية والإذاعية الأخرى.
المناصب التي شغلها:
 - 1**-رئيس قسم الجودة بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية سابقاً.
 - 2**-صيدلي ومسؤول إدارة المخاطر وسلامة المرضي ومؤشرات الأداء بمستشفى الفلاح الدولي بالرياض سابقاً.
 - 3**-كاتب وباحث وروائي مصرى
النشر الصحفى والمقالات بصحف عربية ودولية:
 - 1**-مصر:الأهرام -الأهرام المسائى -روزاليوسف -الزمان -العروبة - الجمهورية
 - 2**-الجزائر: صوت الاحرار- الجديد- كواليس- الأمة العربية- الجمهورية
 - 3**-ليبيا: فيسانيا -صدى المستقبل
 - 4**-صحف للجاليات العربية بالغرب: أيام كندية بكندا وصوت بلادي بالولايات المتحدة الأمريكية

5-العراق: الموقف الرابع-مجلة المرايا-بانوراما شباب-الصباح - الدستور-

البيئة الجديدة

الموسوعات التي ورد ذكر سيرته وإسهاماته بها بين عامي 2019-2021:

1-موسوعة صحفيون بين جيلين -الجزء الثاني إعداد صادق فرج التميمي - العراق

2-مجموعة من أدباء العرب شهريار في بغداد سير ونوصوص إعداد د. زينب السوداني وعبد الزهرة عمارة-إصدارات آمارجي الأدبية العراق.

3-الفيصليون وما يسطرون سجنوه في كتاب-إصدارات الفيصل -باريس.

4-دليل آفاق حرة للأدباء والكتاب العرب الإصدار الثالث إعداد الشاعر محمد صوالحة والروائي محمد فتحي المقداد-الأردن.

5-الموسوعة الحديثة للشعراء والأدباء العرب الجزآن الخامس والثامن عن دار الرضا للنشر والتوزيع ودار الجندي للنشر والتوزيع- مصر.

محتويات الكتاب

5.....	إهداء
6.....	المقالات
7	السلالة الجديدة واللقالات
11	لقالات كوفيد وأسئلة مفتوحة
15.....	مرضى السكري وخطر كوفيد المدق
19.....	علاج فقدان حاستي الشم والتذوق لدى مرضى كوفيد
22.....	الهجوم الأسود
24.....	تجارب علاجية تنبئ بالنهاية
27.....	كل ما تود معرفته عن لقاح سبوتنيك الروسي
30.....	آخر تطورات التجارب العلاجية لكوفيد 19
33.....	كل ما تود معرفته عن اللقاح الصيني سينوفارم
36.....	مارثون اعراض كوفيد 19 (1)
40.....	مارثون اعراض كوفيد 19 (2)
44.....	مارثون اعراض كوفيد 19 (3)
47.....	لقالات كوفيد ومرضى في مرمى الخطر
53.....	الجديد مع الفيروس المتمرد
54.....	كوفيد 19 المستجدات الأخيرة (2022)
59.....	الدراسات
60.....	الدراسة الأولى

جائحة كوفيد-19.. خيارات علاجية.....	60
المدخل.....	61
بحث نشر في الكتاب المحكم.....	62
الخيارات الدوائية قيد التجريب.....	70
الدراسة الثانية.....	86
ادارة أزمة مجتمع الكورونا.....	86
سياسيًّا، اقتصاديًّا، اجتماعيًّا، صحفيًّا.....	86
مقدمة.....	89
التوصيات.....	107
المراجع.....	109
الدراسة الثالثة.....	113
نحو علاج ناجع لفيروس كوفيد-19.....	113
مقدمة.....	114
الدراسة الرابعة.....	127
التجارب العلاجية لفيروس كوفيد-19 إلى أين؟	127
مقدمة.....	129
أبرز التجارب الدوائية الحالية على كوفيد 19.....	135
السيرة الذاتية للمؤلف.....	144
محفوبيات الكتاب.....	152

دراسة علمية
سبحات في عوالم كوفيد 19 الخفية
د. محمد فتحي عبد العال



الطبعة الأولى
1444 هـ 2022 م
دار ديوان العرب للنشر والتوزيع
مصر - بور سعيد

جوال: 00201211132879
00201030502390

E-mail: mohamedhamdy217217@gmail.com

حقوق الطبع والنشر لهذا المصنف محفوظة للمؤلف، ولا يجوز بأي صورة إعادة النشر
الكلي أو الجزئي، أو نسخه أو تصويره أو ترجمته أو الاقتباس منه، أو تحميله رقمياً
وإياه عبر شبكة الإنترنت، إلا باذن كتابي مسبق من المؤلف أو الناشر.